




CRETACICO (Campaniense-Maastrichtiense)

Estado Cojedes

Referencia original: O. Renz y K. C. Short, 1960, p. 291.

Consideraciones históricas: El término Formación Mucaria fue introducido por Renz y Short (1960), para designar un conjunto de lutitas silíceas con algunas calizas y microconglomerados, de edad

Cretácico tardío, que afloran en el norte de los estados Cojedes y Portuguesa. El nombre fue adoptado posteriormente por Oxburgh (1965, 1966); Menéndez (1965, 1966); Jarvis (1966) y Bell (1968). Jarvis (1966) estudió la unidad en la región Pao-Tiznados, entre Cojedes y Guárico, mientras que Bell (1968) la describió detalladamente en la región de Camatagua, Aragua. Peirson (1965-a) consideró que las formaciones Mucaria y San Antonio son sinónimas, pero las aceptó hasta que se unen directamente en el afloramiento entre las áreas de estudio de Menéndez (1965) y de él mismo. Peirson *et al.* (1966), designaron el mismo conjunto de rocas como Formación San Antonio, extendiendo la nomenclatura de Anzoátegui.

Localidad tipo: Renz y Short (*op. cit.*) designaron como localidad tipo de la Formación Mucaria, la quebrada Vaquirita, afluente del río Mucaria, en los cerros Vaquiritos, a unos 4 km al este-sureste del caserío de Pilancones y aproximadamente 11 km al norte de El Pao, distrito Pao del estado Cojedes (Hoja 6544, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Como secciones adicionales dieron una al sur del cerro Pilancones, unos 3,5 km al suroeste del caserío de ese nombre, otra en el cerro Buena Vista, 4 km al norte-noroeste de San Carlos y una tercera en el cerro El Morro, 10 km al sureste de Agua Blanca, en el sector noreste del estado Portuguesa.

Descripción litológica: En la sección tipo, la Formación Mucaria se compone principalmente de lutitas silíceas de color gris oscuro, las cuales meteorizan con color marrón claro. Se encuentra fñanita gris claro en bandas delgadas y capas ocasionales de hasta 1 m de espesor, de un microconglomerado calcáreo formado por fragmentos de rocas ígneas básicas, cuarzo y feldespatos. En tres niveles de la sección, Renz y Short (*op. cit.*) describen calizas lenticulares de grano fino y color gris azulado, que pasa a marrón verdoso claro por meteorización. Las calizas son en parte conglomeráticas, con fragmentos de gneis y esquistos micáceos y fñanita negra. En la sección del cerro Pilancones, la litología es semejante a la descrita, pero sin calizas ni conglomerados. En la sección del cerro Buena Vista, la formación consiste en lutitas y lutitas limosas, sericíticas, con menor proporción de fñanitas. En el cerro de El Morro, la sección incluye tres capas de 3 a 10 m de espesor de areniscas de grano fino y color blanquecino. Menéndez (1965), describe la unidad en el sector del río Araguaita, como formada en un 90% por lutitas silíceas, sericíticas, de color gris oscuro, con cantidades menores de limolitas silíceas a ferruginosas y algunas capas de fñanita gris. Las calizas están notoriamente ausentes en este sector. En el área El Pao-Tiznados, Jarvis (*op. cit.*) describe lutitas similares a las de la sección tipo, formando el 80 a 85% de la sección con 10 a 15% de areniscas de grano fino a medio y conglomerados, y un 5% de calizas afaníticas laminadas, apareciendo la fñanita sólo en pequeñas cantidades. En la región de Camatagua, Bell (*op. cit.*) menciona limolitas silíceas lajosas y lutitas fñisiles color gris, laminares, con cantidades menores de calizas afaníticas laminadas, gris, y areniscas gradadas de color gris claro. Campos *et al.* (1980) propusieron el nombre Miembro Río Chávez para designar unos 100 m de limolitas silíceas gris oscuro, que fueron descritas previamente por Campos y Osuna (1977) como "capas de Río Chávez". Dado la complejidad de las litofacies de la Formación Mucaria, se considera impráctico añadir nombres a cada cambio en sus facies; por lo tanto se propone invalidar este nuevo término, dejándolo como unidad "informal".

Espesor: En la sección tipo, Renz y Short (*op. cit.*) indican un espesor aproximado de 1.000 m. Bell (*op. cit.*) señala que en la región de Camatagua la unidad presenta espesores aparentes de hasta 2.000 m, pero debido al plegamiento inarmónico, es posible que el espesor real esté algo por encima de los 750 m.

Extensión geográfica: La Formación Mucaria se extiende desde la porción noreste del estado Portuguesa, hasta la parte centro-meridional del estado Aragua a lo largo del frente de montañas, formando parte de la faja piemontina del sistema montañoso del Caribe.

Contactos: En la localidad tipo, la Formación Mucaria yace concordantemente sobre la Formación Mapuey (Querecual). Hacia el este, en el área de Camatagua, la formación yace sobre el equivalente de la Formación Querecual. En el tope, la unidad yace gradacionalmente debajo de la Formación Guárico en toda su extensión.

Fósiles: En el área de la localidad tipo, Renz y Short (*op. cit.*) señalaron los foraminíferos *Globotruncana* s.l., *G. stuarti* s.l., *Sulcoperculina* sp. y *Sulcorbitoides* sp. Peirson (en Jarvis, 1966) identificó *Gumbelina atriatra*, *Globotruncana* sp., *Rugoglobigerina* sp, *Gumbelina plummerae* y *Globigerina* sp.; finalmente, Bermúdez (en Bell, 1968) encontró los géneros *Globigerina* y *Chiloguembelina*. En todos los casos, los microfósiles están asociados a las calizas de la formación.

Peirson (1965-a) reportó también a: *Globorotalia velascoensis*, *Globigerina* aff. *triloculinoides* y *Globigerinella escheri* var. *clavata*.

Edad: En base a su contenido faunal, la Formación Mucaria ha sido asignada al Campaniense-Maastrichtiense. Peirson (1965-a) supuso que Mucaria grada hacia el sur al Miembro Guavinita de la Formación Tigre, y a la Formación Vidoño hacia el norte.

Correlación: La Formación Mucaria se considera equivalente lateral de la Formación San Antonio de la región nororiental de Venezuela, su parte inferior es equivalente a la Formación Garrapata (L.E.V. II, 1970).

Menéndez (1965) y Jarvis (1966) postulan su equivalencia lateral, con la Formación Paracotos. Su equivalente en el occidente de Venezuela sería la Formación Colón.

Paleoambientes: Tanto la litología como el contenido faunal, indican que la formación se depositó en un ambiente marino profundo, de aguas tranquilas y poco aporte de clásticos gruesos.

© **P. Jam L., 1997**

Actualizado por: G. D. Kiser, 9 de julio de 1997.

Referencias

- Bell, J. S., 1968-a. The Garrapata Formation of the Venezuelan Coast Ranges. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 11(7): 187-206.
- Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua, Estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 291-440.
- Campos, V. y S. Osuna, 1977-a. Geología de la región de Boca de Uchire. Mem., *V Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, Minis. Energ. y Min., Soc. Venezolano Geol., (I): 449-467.
- Campos, V. y S. Osuna, 1977-b. Sedimentación y tectónica del frente de montaña y de la faja piemontina de la región de Boca de Uchire-Sabana de Uchire, estado Guárico. Guía de Excursión No. 5, Mem., *V Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., Soc. Venezolana Geol., (V): 159-189.
- Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de montañas de la serranía del Interior, estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. *Bol. Geol.*, Minis. Energ. y Min., Caracas, XIV (26): 137-196.
- Jarvis, Jr., H. A., 1966. Geología de la región de río Pao - río Tiznados, Estados Cojedes y Guárico, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 73-115.
- Menéndez, V. de V., A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del Estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.
- Menéndez, V. de V., A., 1966. Tectónica de la parte central de las Montañas Occidentales del Caribe, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 116-139.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.
- Oxburgh, E. R., 1965. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.
- Oxburgh, E. R., 1966. Geology and metamorphism of Cretaceous rocks in eastern Carabobo State, Venezuela Coast Ranges. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 98, p. 241-310.

Peirson III, A. L., 1965-a. Geology of north-central Venezuela. Informe inédito, *Creole Petr. Corp.*, Corpoven: 337 p.

Peirson III, A. L., 1965-b. Geology of the Guárico mountain front. (Geología del flanco sur de las montañas de Guárico). Bol. Inform., *Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, 8(7): 183-212.

Peirson III, A. L., A. Salvador y R. M. Stainforth, 1966. The Guárico Formation of north-central Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(7): 183-224.


Renz, O. y K. C. Short, 1960. Estratigrafía de la región comprendida entre El Pao y Acarigua, Estados Cojedes y Portuguesa. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 277-315.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Konigsmark, T. A., 1958. Geology of the northern Guárico-Lake Valencia area. (Con discusión abierta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1(5): 151-165.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, 6(11): 209-285.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces