

MIOCENO - PLIOCENO (?)

Estado Mérida

Referencia original: R. Giegengach y R. I. Grauch, 1972.

Consideraciones históricas: El nombre de Formación Mucuchíes fue publicado por primera vez por Giegengach y Grauch (1972). Esta unidad fue descrita posteriormente por Grauch (1975).

Localidad tipo: Esta unidad aflora en un solo bloque de falla, aproximadamente a 1 km al suroeste de Mucuchíes (Hoja Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Formación Mucuchíes (Grauch, 1975) se compone de areniscas consolidadas de grano grueso a medio, conglomerados de canto y lentes de arcilla verde-grisácea. La estratificación varía entre unos centímetros y más de 1 m de espesor, y muestra estructuras de corte-relleno y estratificación cruzada.

Espesor: El espesor no se midió, pero se estimó en un mínimo de 200 (?) m (Grauch, 1975).

Extensión geográfica: Sólo aflora en un bloque fallado al suroeste de Mucuchíes.

Contactos: La Formación Mucuchíes suprayace discordantemente al Grupo Iglesias (Precámbrico), e infrayace discordantemente a sedimentos cuaternarios (Grauch, 1975).

Fósiles: Grauch (1975) informa sobre análisis palinológicos, sin especificar identificación específica alguna.

Edad: Con base en los análisis palinológicos, Grauch (1975) sugiere una edad Mioceno-Plioceno, con probables afinidades pliocenas.

Correlación: Grauch (1975) sugirió una correlación con la Formación Betijoque.

Paleoambientes: La fuente de los guijarros y cantos, es la Formación Sierra Nevada (Grupo Iglesias) y, con base en una comparación con los sedimentos cuaternarios, Grauch (1975) sugirió una deposición en un valle angosto con laderas empinadas, probablemente limitado por fallas.

Importancia económica: Ninguna.

Sinonimia: Ninguna.

© **C. Schubert, 1997**

(Actualizado por: José Méndez Baamonde, febrero 1997)

Referencias

Giegengach, R. y R. I. Grauch, 1972. Geomorphologic expression of the Boconó Fault, Venezuelan Andes or geomorphology to a fault: *Geol. Soc. America*, Abstr. with Progr., 4(7): 719-720

Grauch, R. I., 1975. Geología de la Sierra Nevada al sur de Mucuchíes, Andes venezolanos: una región metamórfica de aluminosilicatos: *Bol. Geol. (Venezuela)*, 12(23): 339-442.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)