

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: J. A. Kalliokoski, 1965-a, p. 1042.

Consideraciones históricas: Este término fué mencionado informalmente por Kalliokoski (1965-a, b) para designar el manto dolerítico expuesto en los bordes de la altiplanicie de Nuria, estado Bolívar, en relación con la descripción generalizada de las intrusiones más jóvenes de diabasa en la parte norte del escudo de Guayana. Según Menéndez (1972) este "Gabro de Nuria" es un manto de forma casi anular, emplazado en las rocas graníticas del Complejo de Supamo y encierra un área de unos 400 Km que constituye la Meseta de Nuria, con una altura de 400 metros sobre las sabanas circundantes.

Localidad tipo: Este manto se localiza a unos 25-30 kilómetros al norte de la población de Tumeremo, municipio autónomo Sifontes, hoja de Cartografía Nacional "Guasipati" N° 7838, escala 1:100.000.

Espesor: Según Kalliokoski (1965-a, b), este manto de diabasa tiene un espesor de unos 320 metros y por la geometría de su porción sur-occidental, parece ser una intrusión en forma de platillo con buzamiento centrípeto de unos 20°.

Edad: Su edad se desconoce. Posiblemente pertenece al grupo de doleritas de Roraima (Menéndez, 1972). Estudios de paleomagnetismo hechos por Hargraves (1968), a partir de muestras del Manto, tomadas en las cabeceras de la quebrada Caballape, indicaron que su orientación remanente corresponde al grupo de doleritas noríticas precámbricas (con edad isotópica mínima de 1500 m.a.) que intrusionan al Grupo Roraima mas al sur.

Importancia económica: Puede tener utilidad en la explotación de las lateritas aluminicas originadas por alteración residual de la diabasa, cuyas reservas en el pasado han sido cuantificadas por estudios realizados por el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, podría ser utilizado en la industria de la construcción (piedra triturada, piedra ornamental), así como estudiado por su posible contenido de sulfuros de níquel (Menéndez, 1972).

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Hargraves, P. B., 1968. Paleomagnetism of the Roraima dolerites. *Geophys. J. R. Astr. Soc.*, 16: 147-160.

Kalliokoski, J., 1965-a. Geology of North - Central Guayana Shield, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 76(9): 1027-1050. Resumen (1965) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol Inform., 8(11): 328-329.

Kalliokoski, J., 1965-b. The metamorphosed iron ore of El Pao, Venezuela. *Econ. Geol.*, 60(1): 100-116.

Menéndez, A., 1972. Geología de la Región de Guasipati. Guayana Venezolana. Bol. Geol. Public. Esp. N° 5. *Min. de Minas e Hidroc.*, Caracas, pág. 2001-2046.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

