

CRETACICO TARDIO

Estado Miranda

Referencia original: C. Beck, 1985, p. 174.

Consideraciones históricas: Estas rocas fueron descritas por Beck (1985, p. 174; 1986) para referirse a una serie de rocas carbonáticas y conglomerados, ubicados en la quebrada homónima al [oeste de Cúa](#), estado Miranda, ubicándola en su "Napa de Caucagua - El Tinaco".

Localidad tipo: Se ubica en la quebrada Onoto a 0,5 km al noroeste del pueblo de Sabaneta, a su vez ubicado en la carretera hacia Táchata - Cúa, a unos 9 km al noroeste de esta ciudad, estado Miranda. Hoja 6846, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Beck (1985, p. 194-195; 1986) distingue rocas pelíticas y pelíticas carbonáticas finamente esquistosas, rocas carbonáticas recrystalizadas de color gris claro mostrando una estructura microespática, microconglomerados carbonáticos con fragmentos de equinodermos, conglomerados líticos con cemento carbonático con fragmentos de esquistos verdosos a negro, mármol negro, rocas granudas miloníticas con cuarzo y plagioclasa, pequeños fragmentos de metatoba o metalava con granos dispersos de espinela cromífera. El metamorfismo es de muy bajo grado. Esta unidad se diferencia de la Formación Tucutunemo adyacente, por sus tintes claros (ausencia de materia orgánica o de pirita) y la presencia de niveles carbonáticos - silíceos de grano fino y conglomerados carbonáticos.

Espesor: El autor estima un espesor de 250 m.

Extensión geográfica: Solamente se ha observado en las cercanías de la localidad tipo, en un cuerpo de unos 3 km de longitud por 0,5 km de ancho.

Contactos: Su contacto ha sido interpretado como discordante por encima de la Formación Tucutunemo.

Fósiles: Se encuentran fragmentos de equinodermos, moluscos, algas (*Lithothamium*), secciones enteras de foraminíferos béticos identificados como *Sulcoperculina vermunti*.

Edad: La asociación faunal apunta a una edad Senoniense superior.

Correlación: Beck (1985, p. 206, 1986) la correlaciona con otra de sus unidades informales, las "Capas de la quebrada Sulfurosa" de la misma "Napa de Caucagua - El Tinaco".

Paleoambiente: La asociación faunal y litología sugiere un ambiente de sedimentación de profundidad somera, con abundantes clastos aparentemente provenientes de un substrato subyacente, sugerente de un ambiente transgresivo.


© F. Urbani P., 1997

Referencias

Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, Tesis de doctorado de estado, 462 p.

Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). Soc. Geol. de Nord, Villeneuve sásq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)