




## PRECAMBRICO

Estado Bolívar

**Referencia original:** Menéndez, 1972.

**Consideraciones históricas:** Menéndez (1972), designa con este nombre, a una de las unidades de gneises del Complejo de Supamo que aflora en la parte oeste de la región de Guasipati.

**Localidad tipo:** Río Yuruari (estado Bolívar), 5 Km al oeste de la desembocadura del río Oronato. Hoja 7738, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional.

**Descripción litológica:** La unidad consiste en paragneises cuarzo - feldespático - biotíticos), bandeados en capas de diferente granularidad y con espesores variables entre 10 cm y 2 m, que suelen estar separados por láminas muy ricas en biotita. El bandeamiento está definido por la diferente concentración de biotita de grano fino en láminas de pocos milímetros, hasta algunos centímetros de espesor. Los paragneises alternen con menor proporción de capas localmente lenticulares de anfibolitas y gneises hornabléndicos, y exhiben textura granoblástica; las láminas de biotita de grano fino están orientadas paralelamente al bandeamiento por granularidad, el cuarzo constituye hasta el 50% de las bandas de grano fino, y la plagioclasa hasta el 70% de las bandas de grano grueso. La mineralogía más común es como sigue: plagioclasa (40-70%), microclino (5-15%), biotita (5-20%), cuarzo (10-50%). Ocasionalmente contiene hornablenda azul verde (0-15%), epídoto (1-10%), muscovita (0-5%).

**Ambiente tectónico y petrogénesis:** Las rocas de la unidad han sido metamorfizadas bajo las condiciones de la subfacies cianita - almandina - muscovita, de la facies de la anfibolita armandínica; el paralelismo de las láminas, ricas en biotita, con las capas de anfibolita, además de su riqueza en cuarzo, sugieren su derivación supracortical sedimentaria o volcánica (Menéndez, 1972), aunque no es descartable un origen para la unidad (Klar, 1978, en Menéndez, 1994; 1995).

**Contactos:** El Gneis de Oronato está envuelto por una Zona de Migmatitas, que la separa de las anfibolitas del Grupo Carichapo al este, y de las Trondhjemitas del Complejo de Supamo al oeste.

**Extensión geográfica:** Esta unidad, tiene extensión local al oeste de la región de Guasipati, donde ocupa el núcleo de un pequeño domo, que aflora en el río Yuruari.

**Edad:** Precámbrico. Su edad no ha sido determinada aún. Como parte del Complejo de Supamo, se le asigna una edad mínima de 2000 m.a. Menéndez (*op. cit.*). Una edad de cristalización de 2100 m.a. si las unidades son de origen ígneo o una edad máxima de 2300 m.a. en la fuente, si son de origen sedimentario, por su correlación con los gneises de Santa Cruz y de Las Cosoibas, por estudio en circones de estas unidades hechas por Klar, 1978 (en Menéndez, 1994; 1995).


**Correlación:** La unidad es litológicamente semejante a los gneises de Santa Cruz y de Oronato, constituyentes también del Complejo de Supamo.

© A. Menéndez V., 1997

## Referencias

Menéndez, A., 1972. Geología de la región de Guasipati, Guayana venezolana. *IV Cong. Geol. Venez.*, 1: 380-396.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)