

CRETACICO-TERCIARIO

Trinidad

Wall y Sawkins (1860, p. 12-13, etc.) dividieron las formaciones de Trinidad en tres unidades principales, denominadas Grupo Caribbean (sic) (metamórficas del Northern Range), Grupo Pariense ("Parian") antiguo (sedimentos cretáceos), y Grupo Pariense (sedimentos terciarios). También mencionaron la extensión del Grupo Pariense inferior a Venezuela septentrional. Wall (1860) se refirió más específicamente al "Sistema Pariense Antiguo" en Sucre septentrional, y Guppy (1863) se refirió al Pariense Antiguo en Cumaná. Los términos, derivados del Golfo de Paria, han caído en desuso desde hace mucho tiempo.

Referencias

Guppy, R. J. L., 1863. On the older Parian Formation at Pointe A-Pierre, Trinidad. p. 155-158, en: "Guppy Reprint", 1921, *Bull. Amer. Paleont.*, 8(35): 149-346, de: The Geologist, 1863, p. 267-270.

Wall, G. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and of Trinidad. *Geol. Soc. London*, Quart. Jour., 16: 460-470.

Wall, G. P. y J. G. Sawkins, 1860. Report on the geology of Trinidad. *Geol. Surv.*, Mem. London, 211 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Jahn, A., 1921. Esbozo de las formaciones geológicas de Venezuela. Litografía del Comercio, Caracas, 108 p.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-1893. Geogr. Gesell. Hamburg, Mite., 12: 327.

[Enviar Comentarios](#)

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)