

CRETACICO (Aptiense-Albiense)

Estado Lara

Referencia original: Garcia Jarpa, F.; S. Ghosh; F. Rondón; I. Fierro; M. Sampol; G. Benedetto; C. Medina; O. Odreman; T. Sánchez y A. Useche, 1980.

Consideraciones históricas: Aguasuelos (en Kiser, 1997) citan a García Jarpa *et al.* (1980) para revalidar el uso de "Peñas Altas", incluyendo en la secuencia, en orden ascendente, a "los clásticos basales o río Negro. Tibú o Apón, Guaimaros, Peñas Altas o Aguardiente, pero sin incluir a las calizas de la Formación La Puya". Restringsen el nombre a los estados Lara y Trujillo, al norte de la falla de Boconó y en el área de Boconó, entre las Fallas Boconó y La Soledad-Yacambú.

Descripción litológica: Aguasuelos (*op. cit.*) describen en la sección de El Jabón, al oeste de Barbacoas, una unidad inferior compuesta predominantemente de cuarzoarenitas gris claras, de grano fino, sacaroideas a friables, con algunas intercalaciones de calizas masivas gris oscuras, afaníticas y fosilíferas que alternan con calizas grises coquinoideas y lutitas negras micro-laminadas. En la sección de San Pedro, la unidad superior se compone de lutitas grises, masivas, de litología monótona y algunas areniscas cuarzosas blancas, de grano fino a grueso.

Espesor: Aguasuelos (*op. cit.*) estiman 930 m en la quebrada Porras, 700 m en el cerro Peñas Altas y mas de 1300 m en el área de La Loma.

Contactos: Descansa sobre las Formaciones La Quinta, Mucuchachí o Palmarito con discordancia angular, y está cubierta concordantemente por la Formación La Luna, Miembros La Aguada o Chejendé, según el área.

Fósiles: Mencionan a *Chofatella decipiens* y *Orbitulina cf. concava texana*, mas abundantes gasterópodos y bivalvos. Identifican a los icnofósiles *Spongeliomorfa*, *Cochlichnus*, *Monocriterio* y *Thalassinoides*.

Edad: Aguasuelos (*op. cit.*) asignan la formación al Aptiense Temprano a Tardío (llegando quizás al Barremiense) en su parte inferior, y al Albiense Temprano a Tardío en su parte superior.

Correlación: Correlacionan su Peñas Altas cronológicamente con el Grupo Cogollo en el oeste y con las Formaciones Borracha, El Cantíl y García de la Serranía del Interior.

Paleoambiente: Interpretan dos ciclos completos de transgresión-regresión, con paleoambiente predominante de plataforma interna, con profundidades entre cero y 80 m, pero con oscilaciones que varían entre ambientes de sabka y laguna hipersalina hasta talud superior con profundidades de 250 m.

Véase [AGUARDIENTE, Formación](#).

© G. D. Kiser, 1997

Referencias

Garcia Jarpa, F.; S. Ghosh; F. Rondón; I. Fierro; M. Sampol; G. Benedetto; C. Medina; O. Odreman; T. Sánchez y A. Useche, 1980. Correlación estratigráfica y síntesis paleoambiental del Cretáceo de los Andes venezolanos. Bol. Geol., Minis. Energ. y Min., Caracas, XIV(26): 3-88.

Kiser, G. D., 1997. Comentarios enviados al CIEN, *Comite Interfilial de Estratigrafía y Nomenclatura de PDVSA*.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 1961. Code of Stratigraphic Nomenclature. *Amer. Assoc. Petról. Geol.*, Bull., 45(5): 645-665. Versión al castellano: "Código de Nomenclatura Estratigráfica" preparada por el Inst. Geol. UNAM., *Soc. Geol. Mex. y Asoc. Mex. Geol. Petról.*, México, D. F.

Gaenslen, G., 1962. A discission of the Cretaceous stratigraphy of the southwest Barinas mountain front. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(3): 65-74.

Notestein, F. B.; C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 55(9): 1165-1216.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretaceo en Venezuela Occidental. *Boletín de Geología.*, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 5(10): 3-48.

Rod E. y W. Maync, 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela: *AAPG Bull.* 38: 193-283.

Salvador, A., 1961-b. Guidebook to the geology of northeastern Trujillo. *Soc. Geol. Venez. Occid.*, Guidebook N° 3, 33 p.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Sutton F. A., 1946. Geology of the Maracaibo basin, Venezuela: *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)