


**PRECAMBRICO TARDIO**

Estado Zulia

Referencia original: R. A. Liddle, G. D. Harris y J. W. Wells, 1943, p. 278.

Consideraciones históricas: Liddle, Harris y Wells (1943), definieron con el nombre de Serie Sierra de Perijá, al complejo basal de dicha sierra, en el estado Zulia. Sutton (1946) abrevió el nombre a Serie Perijá, ampliando la descripción litológica. Hea y Whitman (1960), describieron la Serie Perijá en el caño Grande, afluente del río Cachirí, ubicándola en su columna estratigráfica por encima de lo que llamaran el basamento, e infrayaciendo a la Formación Caño Grande del Devónico. Bowen (1972), considera que la secuencia descrita como Serie Perijá, es en realidad una unidad litoestratigráfica y le asigna rango formacional.

Localidad tipo: Ubicada en el caño Grande, afluente del río Cachirí, Perijá, estado Zulia. Hoja 5748 a escala 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: En la descripción original, Liddle *et al.* (1943) describieron la Serie Sierra de Perijá, constituida litológicamente por cuarcitas duras cortadas por diques y vetas de cuarzo blanco, junto con micaesquistos y esquistos gnesoides intrusionados por granito. Sutton (1946), amplió la descripción al granito y Hea y Whitman (1960) describieron la unidad compuesta por esquistos biotíticos, muscoíticos, tremolíticos, cuarzo feldespático y metacuarcitas cloríticas, cortadas por pequeños diques aplíticos de color rojo naranja y vetas de cuarzo lechoso, señalando su grado de metamorfismo correspondiente a la facies de los esquistos verdes.

Espesor: Liddle *et al.* (1943), mencionaron espesores de 300 m (1.000pies) aproximadamente. Liddle (1946), estudió una sección de 250m de espesor en la parte superior del caño Grande y Hea (1964) una de 1.000 m en el mismo caño.

Extensión geográfica: La unidad aflora en la región del río Cachirí, en el caño Grande, en los caños del oeste y del sur y en el caño Aburrído, afluente del río Socuy. También se menciona su presencia en pozos perforados hasta el basamento, en la región de El Totumo y en la serranía de Valledupar en Colombia.

Expresión topográfica: Aparentemente constituye los elevados picos de la serranía de Valledupar en Colombia, y parte de la sierra de Perijá en el estado Zulia (Liddle 1946; Trumphy, 1943).

Contactos: La Formación Perijá se ubica por arriba del basamento, posiblemente en relación de discordancia, e infrayace a la Formación Caño Grande del Grupo Río Cachirí, en contacto de falla (Hea y Whitman, 1960). Según Bowen (1972), la unidad infrayace a los sedimentos no metamorfizados del Grupo Río Cachirí del Devónico, en tres localidades en contacto de falla; todas son fallas normales de ángulo alto (70°), según este autor, quien también señala contactos de falla en el tope de la formación con areniscas de la Formación Río Negro.

Fósiles: Ninguno.

Edad: Liddle *et al.* (1943), la consideran de posible edad (?) Precámbrica; Hea y Whitman (1960) consideran que la unidad puede abarcar un rango de tiempo más amplio, y en su columna estratigráfica la ubican desde el Precámbrico Superior al Devónico inferior, (?). Bowen (1972), la considera Pre-Devónica, sin más especificaciones.

Correlación: Tentativamente se la ha correlacionado con el Gneis de Santo Domingo o la Serie Iglesias de los andes de Mérida, aunque el grado de metamorfismo es diferente.

Paleoambiente: La formación no es lo suficientemente conocida, como para precisar sus ambientes de formación. Hea y Whitman (1960) señalaron que tiene el aspecto típico de metamorfismo aureolar en una sucesión de areniscas y lutitas, separables del Devónico más bien por el grado que por el tipo de alteración. Según Bowen (1972), las evidencias de campo indican la derivación de estas rocas metamórficas, de una sucesión sedimentaria

clástica compuesta de areniscas arcósicas gruesamente estratificadas a macizas, que gradan y están separadas por estratos más delgados de lutitas; no se observan verdaderas características sedimentarias.

Importancia económica: Ninguna.

Sinonimia: Serie Sierra de Perijá y Serie Perijá.

© **O. Odremán y A. Useche C., 1997**

Referencias

Bowen, J. M., 1972. Estratigrafía del Precretáceo en la parte norte de la Sierra de Perijá. *IV Cong. Geol. Venez.*, Mem. 2: 729-760.

Hea, J. P. y A. B. Whitman, 1960. Estratigrafía y Petrología de los sedimentos precretácicos de la parte nort-central de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Mem. 1: 351-375.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad.*, 2 ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. y.

Liddle, R. A., G. D. Harris y J. W. Wells, 1943. The Río Cachim section in the Sierra de Perijá, Venezuela, *Bull. Am. Paleont.*, 27(108): 273-375.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Trumpy, D., 1943. Precretaceous of Colombia. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 54(9).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)