


PICUDA, Miembro (Formación Barranquín)

VALIDO



CRETACICO (Barremiense-Aptiense)

Estado Sucre

Referencia original: E. Von der Osten, 1954, p. 137.

Esta unidad fue descrita originalmente por Von der Osten (1954, 1957) como un intervalo, de 425 metros de espesor, de areniscas cuarcíticas, interestratificadas con lutitas multicolores, suprayacente a las calizas del Miembro Morro Blanco de la Formación Barranquín. Su localidad tipo se encuentra en la isla Picuda Grande, frente a la costa occidental del Estado Sucre. Según Rosales (1960), el Miembro Picuda se diferencia del Miembro Taguarumo, suprayacente, únicamente en la localidad tipo que les es común, y para su empleo en tierra firme extendió la definición del primero para incluir las dos unidades de Von der Osten.

Véase [BARRANQUIN, Formación](#).

Referencias

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo-Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 471-495.

Von der Osten, E., 1953-54. Geología de la región de la bahía de Santa Fé, (estado Sucre), *Boll de Geol.* (Venezuela), 3(8): 123-211.

Von der Osten, E., 1957-a. A Fauna from the Lower Cretaceous Barranquín Formation of Venezuela. *Jour. Paleont.*, 31(3): 571-594, pls. 63-65.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, E. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, E. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.

Karsten, H., 1850. Beitrag zur Kenntniss der Gesteine des Nordlichen Venezuela, *Deutsch. Geol. Gesell. Zeit.*, 2: 345-361.

Kugler, H. G., 1963. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, Vereining. *Schweiz. Petr.-Geol. und -Ing., Bull.*, 20(59), Basel: 27-60.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Maync, W., 1949-50. The foraminiferal genus *Choffatella* Schlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean Region (Venezuela, Cuba, Mexico, and Florida), *Eclog. Geol. Helv.*, 42(2): 529-547.

Maync, W., 1953. *Pseudocyclammina hedbergi* n. sp. from the Urgo-Aptian and Albian of Venezuela, *Cushman Found. Foram. Res., Contrib.*, 4(3): 101-103.

Rod, E. and Maync, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 38(2): 193-283.

Royo y Gómez, J., 1953. Fósiles del Cretácico Inferior de Venezuela, *Acta Cientif. Venez.*, 4(4): 135-153.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-93, *Geogr. Gesell. Hamburg, Mitt.*, 12: 327 p.

Wall, G. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and Trinidad, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 16: 460-470.

Wells, J. W., 1944. Cretaceous, Tertiary, and recent corals, a sponge, and an Algae from Venezuela, *Jour. Paleont.*, 18(5): 429-447.

Enviar Comentarios



1st Ed. English



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)