

CRETACEO

Estado Guárico

Este término fue introducido por Konigsmark (1958) para designar lechos cretáceos expuestos en Guárico septentrional, descritos posteriormente en mayor detalle por el mismo autor (1965). Jarvis (1966) se refirió brevemente a la unidad como equivalente probable de la parte inferior de la Formación Mucaria, tal como él y otros la muestran en sus mapas, en Guárico septentrional y Cojedes. Según Peirson *et al.* (1966), las capas descritas por Konigsmark son heterogéneas, y representan partes de las formaciones San Antonio (=Mucaria), Guárico y Garrapata, por lo cual consideraron que el término es innecesario y tiende a crear confusión. El nombre no fue incluido en el Cuadro de Correlación del Primer Congreso Venezolano del Petróleo (Soc. Venez. Ing. Petról., 1963) y se considera como inválido.

Referencias

Jarvis, Jr., H. A., 1966. Geología de la región de río Pao - río Tiznados, Estados Cojedes y Guárico, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 73-115.

Konigsmark, T. A., 1958. Geology of the northern Guárico-Lake Valencia area. (Con discusión abierta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1(5): 151-165.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

Peirson III, A. L., A. Salvador y R. M. Stainforth, 1966. The Guárico Formation of north-central Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(7): 183-224.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. I Congr. Venez. Petról., Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)