




PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: V. Mendoza, 1974, p. 318.

Consideraciones históricas: Mendoza (1974) propone el término Granito de Pijiguaos, para designar a un granito leucocrático, de grano fino, de aspecto subvolcánico, que aflora en el área del río Suapure y que podría extenderse por las partes bajas de los ríos Parguaza, Villacoa y Ventuari. Mendoza (*op. cit.*) incluye esta unidad en el Grupo Suapure, a su vez constituyente del Supergrupo Cedeño, ambos términos propuestos por el mismo autor.

Localidad tipo: Mendoza (*op. cit.*) no menciona localidad tipo pero indica que hay buenos afloramientos a lo largo de las quebradas El Paují, El Caballo y Caña Brava, en la cuenca del río Suapure, en la región noroccidental del estado Bolívar (Hoja ?????, esc. ????, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: El granito es de grano fino a medio, de color rosado salmón, macizo, de aspecto subvolcánico, sin cataclasis y sin desarrollo de textura gráfica. Consiste esencialmente de feldespato potásico (30-35%), plagioclasa albitica (25-30%), cuarzo en glomérulos (25-30%) y biotita marón (1-3%), apatito (0-4%) y opacos (1-3%) como accesorios y epidoto y clorita como secundarios.

Espesor: No se menciona en la descripción original.

Extensión geográfica: Aflora en las quebradas El Paují, El Caballo, y Caña Brava, afluentes del río Suapure. El autor menciona que de acuerdo al estudio de imágenes de radar su área de afloramiento podría extenderse hacia las partes bajas de los ríos Parguaza, Villacoa y Ventuari. Sin embargo en estudios geológicos regionales realizados en la parte norte-central del estado Amazonas, no se menciona afloramientos de esta unidad.

Contactos: Aflora por debajo del Granito de El Parguaza, se han observado xenolitos no orientados de la roca descrita dentro del Granito de El Parguaza.

Edad: No se han hecho determinaciones de edad en el granito, pero se ha establecido que las rocas del Grupo Suapure: el Granito de El Parguaza y sus facies de borde el Granito de Pijiguaos, representan el evento Parguazensis. Determinaciones de edad en el granito de El Parguaza han dado, por los métodos Rb/Sr y U/Pb, entre 1490 y 1590 m.a. (Moreno *et al.*, 1977).

Correlación: El autor menciona que podría ser equivalente a los granitos de grano fino y microgranitos asociados al Granito de Guanamito (Ríos, 1972).


© J. H. Ríos, 1997

Referencias

Mendoza, V., 1974. Geología del área del río Suapure, parte noroccidental del Escudo de Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. *IX Cong. Geol. Inter-Guayanas*, p. 306-338.

Moreno, L., P. Lira, V. Mendoza, J. H. Ríos, 1977. Análisis de edades radiométricas en la parte oriental de la Guayana venezolana y eventos tectónicos registrados. *V Cong. Geól. Venez.*, 2: 509-518.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)