




CRETACICO TARDIO

Estado Guárico

Referencia original: T. A. Konigsmark, 1958, mapa y p. 262.

Consideraciones históricas: Konigsmark (1958, 1965) introdujo este término para designar cuerpos de diorita y brechas de diversos tipos que intrusionan a la Formación Garrapata en forma de "sills" en

Guárico noroccidental. González y Picard (1971, 1972) cartografían estas rocas en el sector del cerro Pariapán, e igualmente las consideran intrusivas.

Localidad tipo: Curso inferior del [río Platillón](#), que drena del pico homónimo, en Guárico noroccidental. Esta localidad se encuentra a unos 20 km al suroeste de San Juan de los Morros, estado Guárico. Hoja 6645, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La diorita de esta unidad contiene aproximadamente un 65% de oligoclasa (muy alterada, lo cual le imparte un aspecto nublado); el volumen restante es augita en granos anhedrales y subhedrales, caracterizados por una laminación basal muy marcada, a lo largo de la cual ha habido leve alteración a anfíbol o clorita. En la quebrada Platillón, la diorita piroxénica es de grano muy grueso en el centro de los cuerpos; hacia los bordes el tamaño de los cristales disminuye, aumenta el brechamiento y se desarrolla foliación y lineación paralelas a la roca caja. La roca caja que circunda la porción brechada ha sufrido alteración parcial a prehnita, anfíbol, calcita y clorita. En general el brechamiento se presenta en todo el espesor del "sill", pero localmente se restringe a zonas determinadas dentro de la diorita piroxénica. La porción brechada puede componerse únicamente de fragmentos ígneos, o de una mezcla de rocas ígneas y sedimentarias. Según Konigsmark, el brechamiento probablemente se debió a que, en algún momento del ciclo magmático, la presión del vapor del agua asociada con el intrusivo casi sólido excedió la presión confinante de la sobrecarga de roca, ocasionando la liberación explosiva de gas a través de una zona debilitada de la roca suprayacente, y en consecuencia, la repentina y quizás explosiva expansión del agua o líquido presente en los espacios porosos intergranulares de la diorita piroxénica.

Espesor: Variable entre 0 y 150 m.

Extensión geográfica: Siempre se encuentra asociada a la Formación Garrapata, desde el río Platillón donde aflora en cuerpos hectométricos, hasta otros afloramientos mayores ubicados en la localidad tipo de la Formación Garrapata, en el cerro Pariapán a unos 2 km al este de San Juan de los Morros. En este lugar la cartografía geológica presentada por de Konigsmark (1958, 1965), González y Picard (1972) y González de Juana *et al.* (1980, p. 301) muestran cuerpos elongados en dirección noroeste - suroeste de 100 a 150 m de espesor y de hasta 3 km de longitud.

Contactos: Concordante y a veces gradual con la roca caja de la Formación Garrapata (Konigsmark, 1965).

Edad: Konigsmark (1965) propone una edad Coniacense, pero se prefiere señalar una edad Cretácico Tardío sin diferenciar.

Paleoambiente: Konigsmark (1965) y González y Picard (1972) indican que estos cuerpos son intrusivos dentro de la Formación Garrapata, mientras que en opinión de E. Navarro F. y S. Talukdar (com. pers. al autor de esta recopilación) estas rocas ígneas no corresponden a "sills", sino a bloques incorporados dentro de la Formación Garrapata.

Correlación: Menéndez (1965) señaló la gran similitud entre estas rocas y la brecha ígnea de Sabana Larga, descrita por él en la región de El Tinaco, estado Cojedes, con la cual correlaciona.

© F. Urbani P., 1997

Referencias

González de Juana, C., J. M. Iturralde y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Edic. Foninves, Caracas, 2 vols., 1031 p.

González S., L. y X. Picard, 1971. San Juan de los Morros. *Ministerio de Energía y Minas*, Dirección de Geología, mapa geológico, hoja 6745, escala 1:100.000.


González S., L. y X. Picard, 1972. Sedimentación y aloctonía en el frente de montañas de Guárico. *Memor. VI Confer. Geol. del Caribe*, Margarita, p. 83-88.

Konigsmark, T. A., 1958. Geology of the northern Guárico - Lake Valencia area. *Bol. Inf., Asoc. Venez. Geol. Min. Petrol.*, 1(5): 151-165.

Konigsmark, T. A., 1965 Geología del área de Guárico septentrional - Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

Menéndez V. de V., A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)