




NEOGENO (Mioceno Medio a Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Suter, 1947, p. 2.195.

Consideraciones históricas: La primera referencia aparece en Suter (1947), quien coloca a la Formación Pozón en la parte superior del Grupo Agua Salada y la subdivide en los miembros Policarpio, Husito y Huso. La descripción detallada, junto con el estudio bioestratigráfico y sistemático de los foraminíferos, es publicada por Renz (1948). Blow (1959), estudia asimismo los foraminíferos, con énfasis en los planctónicos, y reconoce varias zonas establecidas en Trinidad para la parte inferior de la unidad, proponiendo nuevas zonas para la parte más joven. Wheeler (1960, 1963) aunque estudia esta formación no añade nuevos datos sobre esta unidad. Díaz de Gamero (1985b), redefine el Grupo Agua Salada, incluyendo la Formación Guacharaca como su unidad inferior, e introduce el término Formación Agua Salada, para toda la sección arcillosa oligomiocena que aflora en la parte nororiental de la cuenca. En esta región, tan sólo se puede discriminar el Miembro El Salto como unidad litoestratigráfica.

Localidad tipo: Entre la estación trigonométrica de Pozón y el cerro Ojo de Agua, en dirección norte-sur, a lo largo de la vertiente de la Loma Luca, entre afluentes de la quebrada Agua Salada, al oeste, y de la quebrada Araguata, al este. Hoja de Cartografía Nacional N° 6448, a escala 1:100.000.

Descripción litológica: De acuerdo con Renz (1948), la formación consiste principalmente de arcillas margosas y arcillas, con un desarrollo glauconítico de poco espesor en la base. Este constituye el Miembro de Arenas Glauconíferas de Policarpio, compuesto de arcillas fosilíferas mal estratificadas; arcillas margosas y arenas glauconíferas, con concreciones ferruginosas y de marga blanca. El término arena está mal empleado, por estar constituido por granos de glauconita en una matriz arcillosa.

El Miembro de Arcillas Margosas de Husito, está compuesto por arcillas margosas de color gris pardo a marrón chocolate, intercaladas con abundantes margas de foraminíferos, más frecuentes hacia arriba, y un horizonte de concreciones de marga consolidada blanca y amarilla. Toda la sección contiene granos diseminados de glauconita.

El Miembro de Arcillas de Huso, es el superior, se compone de arcillas con intercalaciones de margas y arcillas margosas amarillas, con lentejones delgados de arena calcárea de grano fino hacia el tope.

Espesor: La formación tiene 1.042 m de espesor en la sección tipo, que pasa a una sección incompleta de 1.120 m en el Mene de Acosta, donde falta el tope. Renz (1948), mencionó que la unidad se adelgaza hacia el oeste y engrosa hacia el este y norte.

Extensión geográfica: La formación aflora extensamente en toda la región de Falcón oriental, y está particularmente bien expuesta en el flanco sur del anticlinal de El Mene de Acosta-Pozón (Renz, 1948).

Expresión topográfica: La Formación Pozón no desarrolla elevaciones, debido a su litología arcillosa.

Contactos: En la sección tipo, la Formación Pozón suprayace a la Formación San Lorenzo, con un contacto de ligera discordancia angular, que pasa a ser concordante hacia el norte. El contacto superior con la Formación Ojo de Agua es concordante, transicional y de carácter diacrónico, ya que es más antiguo en el oeste y gradualmente más joven hacia el este (Renz, 1948).

Fósiles: La formación es ricamente microfossilífera en general, y muy especialmente, en el Miembro Husito. Renz (1948), hace un estudio sistemático y bioestratigráfico de los foraminíferos, y establece las zonas de *Siphogenerina transversa* (parte superior), *Globorotalia fohsi*, *Valvulineria herricki*, *Marginulinopsis basispinosus* y *Robulus senni*, y las zónulas de *Vaginulinopsis superbis-Trochammina* cf. *pacifica*, *Textularia panamensis* y *Elphidium poeyanum-Reussella spinulosa*. Blow (1959), estudia igualmente los foraminíferos, concentrándose en los planctónicos. En base a éstos, reconoce varias zonas previamente establecidas en Trinidad y propone las siguientes para la parte superior de la formación: zonas de *Globorotalia menardii menardii*/*Globigerina nepenthes*,

Sphaeroidinella seminulina y *Globigerina bulloides*, parte inferior. Van Der Bold (1966), estudia sistemáticamente la microfauna de ostrácodos.

Edad: De acuerdo a los esquemas modernos, la edad de la Formación Pozón, en su localidad tipo, ocupa todo el Mioceno Medio y casi todo el Mioceno Tardío, desde las zonas de *Globorotalia fohsi peripheroronda*, hasta un nivel indeterminado dentro de la de *Globorotalia* (= *Neogloboquadrina*) *humerosa* (Díaz de Gamero, 1985b). En la región nororiental, sin embargo, la Formación Agua Salada, que incluye equivalentes de la Formación Pozón, alcanzó tan sólo la parte inferior de la zona de *Globorotalia acostaensis*, la inferior del Mioceno Tardío (Díaz de Gamero, 1985b). Giffuni *et al.* (1992) reconocen equivalentes de la Formación Pozón (parte superior de la Formación Agua Salada) al oeste del río Rico, donde esta unidad alcanza la Zona de *Globorotalia* (= *Neogloboquadrina*) *humerosa*.

Correlación: En su localidad tipo, la Formación Pozón se correlaciona con las formaciones Socorro y Caujarao, en parte.

Paleoambientes: Según Renz (1948), las condiciones ambientales de los miembros Policarpio y Husito se mantienen esencialmente constantes, indicando sedimentación a profundidades entre 200 y 600 m, en condiciones marinas normales y clima tropical. En el miembro Huso, se evidencia un proceso regresivo, disminuyendo las profundidades desde 100 m en la parte inferior, a 50 m en su parte media y, finalmente, a condiciones marinas muy someras con influencia de aguas salobres, al tope. Blow (1959), no cambia estas interpretaciones. Van Der Bold (1966), en base a los ostrácodos, interpreta una profundidad marina de unos 100 a 170 m (300-500 pies) para la mayor parte del Miembro Husito, pasando a unos 30 a 70 m (100-200 pies) para la parte superior del miembro y menos de 30 m (100 pies) para el Miembro Huso.

Véanse [POLICARPIO, Miembro](#); [HUSITO, Miembro](#); [HUSO, Miembro](#); [AGUA SALADA, Grupo](#); [AGUA SALADA, Formación](#).

© M. L. Díaz de Gamero, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.

Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venezolana Geol.*, Bol., 46:7-15.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer.*, Mem., 32, 219 p.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez., Mem.*, 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Van Der Bold, W. A., 1966. Ostracoda of the Pozón section, Falcón, Venezuela, *Jour. Paleont.*, 40(1): 177-185.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bolli, H. M., 1957-a. The genera *Praeglobotruncana*, *Rotalipora*, *Globotruncana* and *Abathomphalus* in the Upper Cretaceous of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 51-60.

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 97-123.

Bolli, H. M., 1957-d. Planktonic foraminifera from the Eocene Navet and San Bernardo formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 155-172.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Catì; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87, 491-503.

Comisión Venezolana de Estratigrafía y Terminología, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp. 1*, 728 p.

Cushman, J.A. y Renz, H. H., 1941. New Oligocene-Miocene Foraminifera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res., Contr.*, 17(1): 1-27.

Díaz de Gamero, M. L., 1970. Contribución al estudio de los foraminíferos de la Formación Punta Gavilán, Estado Falcón, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inf.*, 13(2): 47-94.

Jeannet, A., 1928. Contribution a l'étude des Echioides tertiaires de la Trinité et du Venezuela, *Soc. Paleont. Suisse, Mem.*, 48: 1-44.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados, *8th. Amer. Sci. Congr. U.S.A., Proc.*, 4: 513-571

Renz, H. H., 1959. San Lorenzo Formation (Agua Salada Group) of eastern Falcón, Venezuela, a valid lithostratigraphic name, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 43(10): 2500-2502.

Renz, H. H. y Sutter, H. H., 1939. The Pozón and Mene de Acosta type sections of the Agua Salada Formation (Abstract), *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(8): 1242.

Rutsch, R., 1934. Die Gastropoden aus den Neogen der Punta Gavilán-Schichten in nord-Venezuela, *Soc. Paleont. Suisse, Mem.*, 54-55, 169 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Suter, H. H., 1937. Notas geológicas sobre la Formación Punta Gavilán de la región oriental del Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 287-297.

Enviar Comentarios

		
2a Edición LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)