

TERCIARIO (Mioceno Temprano)

Trinidad

Referencia original: H. M. Bolli, 1966, p. 22.

Este nombre fue publicado por Bolli (1966) para designar la parte superior de la Zona de *Globigerinatella insueta*, redefinida anteriormente por el mismo autor (1957-c) como la parte superior de la zona del mismo nombre que había sido establecida por Cushman y Renz (1948) en Trinidad. Bolli (1966) definió la Zona de *Praeorbulina glomerosa* como el intervalo comprendido entre la primera aparición de la especie titular, hasta la última de *Globigerinatella insueta*.

Véase *GLOBIGERINOIDES SICANUS - GLOBIGERINATELLA INSUETA*, Zona de *.

* **NDR:** No existe en el Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. edición.

Referencias

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 97-123.

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 9(1): 3-32.

Cushman, J. A. y H. H. Renz, 1947. The foraminiferal fauna of the Oligocene Ste. Croix Formation of Trinidad, *B.W.I. Cushman Lab. Foram. Res., Sp. Publ.* 22, 46 pp.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces