




TERCIARIO (Paleoceno)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg y A. Pyre, 1944, p. 14.

Esta zona fue establecida por Hedberg y Pyre (1944) en la Formación Vidoño, estado Anzoátegui y reconocida por Sellier de Civrieux (1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*, bajo "ORTIZ") en la

Formación Guárico. Autores posteriores (Bolli, 1957-b; Stanley, 1960; Renz, 1962; Lamb, 1964-b) han preferido zonaciones a base de foraminíferos planctónicos, y el término ha caído en desuso.

Referencias

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 20(1): 1-28.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the rio Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform.*, 7(4): 111-123.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform.* 5(4): 89-108.

Stanley, D. F., 1960. Stratigraphy and foraminifera of Lower Tertiary Vidoño Shale, near Puerto La Cruz, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 44(5): 616-627.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)