




DEVONICO

Estado Zulia

Referencia original: R. A. Liddle, 1928, p. 97.

Consideraciones históricas: Esta unidad fue descrita originalmente por Liddle (1928), con el nombre Serie Río Cachimí. Sutton (1946), redefine formalmente la unidad con categoría de grupo, denominándola Grupo Cachimí, criterio éste que ha prevalecido con la modificación hecha por Weisbord (1956), quien la llamó Grupo Río Cachimí. Posteriormente, Hea y Whitman (1960), proveen las descripciones más detalladas que se conocen de esta unidad.

Localidad tipo: La localidad tipo se encuentra en las cabeceras del río Cachimí, unos 89 km. al oeste de Maracaibo, distrito Maracaibo, estado Zulia. Hoja 5748, escala 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: El grupo consiste principalmente de lutitas color negro, gris y rojo, areniscas grises micáceas, areniscas cuarcíticas y calizas de color rojo, gris azulado y negruzco. Liddle *et al.* (1943), describe el grupo compuesto por tres formaciones: Formación Caño Grande, Formación Caño del Oeste y Formación Campo Chico de más vieja a más nueva, respectivamente. Posteriormente, Bowen (1972), define una cuarta formación a la cual denomina Formación Los Guineos en la base del grupo.

Espesor: Liddle *et al.* (1943), mencionan un espesor total para el grupo, de 2.438 m.

Extensión geográfica: La unidad se extiende desde las cabeceras del río Cachimí, ocupando una faja a lo largo del flanco oriental de la sierra de Perijá, continuando hacia el sur, desde el extremo norte de la sierra en el distrito Páez, hasta los distritos Mara, Maracaibo y Perijá cubriendo una distancia aproximada de 110 km., llegando posiblemente hasta el norte de la República de Colombia, al este de Manaure (Trumpy, 1943) y en la sierra nevada de Santa Marta (Gansser, 1955).

Expresión topográfica: No se reconocen expresiones topográficas características, formadas por las rocas de este grupo.

Contactos: El grupo suprayace en contacto discordante y posiblemente de falla, las metamórficas de la Serie Perijá, e infrayace discordantemente a formaciones del Paleozoico Superior y Mesozoico del Grupo La Ge.

Fosiles: La parte basal y media del grupo, Formaciones Caño Grande y Caño del Oeste, ha provisto una abundante fauna de invertebrados fósiles, compuesta principalmente de branquiópodos, bivalvos, corales, briozoarios, gasterópodos, crinoideos y trilobites. En la parte superior, Formación Campo Chico, se encontró una serie de restos de vegetales fósiles, compuestos por improntas de tallos de psilophytales y cycadales, las cuales constituyen las primeras plantas continentales que se conocen en el registro paleontológico.

Edad: Los datos aportados por los invertebrados y las plantas fósiles, indican para el grupo una edad que va, desde la parte superior del Devónico Inferior, hasta el Devónico Superior.

Correlación: El Grupo Río Cachimí constituye hasta el momento único sedimento de edad devónica descrito para Venezuela. Sus correlaciones serían con formaciones devónicas aflorantes en Colombia.

Paleoambientes: Se postula en general un ambiente de aguas llanas, poco profundas, desde francamente marinas hasta salobres, y con gran influencia continental en la parte superior (Formación Campo Chico).

Importancia económica: No se ha determinado.

Sinonimia: Serie Río Cachimí.

© O. Odreman y A. Useche, 1997

Referencias

Bowen, J. M., 1972. Estratigrafía del Pre-Cretáceo en la parte norte de la Sierra de Perijá, Mem. *IV Congr. Geol. Venez.*, 2: 729-760.

Gansser, A., 1955. Ein Beitrag Sur Geologie und Petrographie der Sierra Nevada de Santa Marta (Kolumbie, Sudamerika). *Schweiz. Min. Petr. Mitt.*, 35(2): 209-279.

Hea, J. P. y A. B. Whitman, 1960. Estratigrafía y Petrología de los sedimentos precretácicos de la parte norte-central de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas. Mem. 1: 351 -376.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. Mag Gowam, Fort North Texas. p. 552.

Liddle, R. A., G. D. Harris y J. W. Wells, 1943. The Río Cachirí Section in the Sierra Perijá, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.* 27(108): 273-365.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Publ. Esp. 1, 728 p.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol Geol. Bull.* , 30(10): 1.621-1.741.

Trumpy, D., 1943. Pre-Cretaceous of Colombia. *Geol. Soc. Am.*, Bull. 54(9): 1.281-1.304.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Caster, K. E., 1939. A Devonian fauna from Colombia, *Bull. Am. Paleont.*, 24(86): 218.

Caster, K. E., 1942. The age and relations of Colombian Devonian strata, 8th. *Am. Sci. Cong.*(1940), Pr., 4: 27-88.

Christ, P., 1927. La coupe géologique le long du chemin de Muonchachi á Sta. Barbara dans les Andes vénézuéliennes, *Eclog. Geol. Helv.*, 20(3): 397-414.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng.*, Tr., p. 677-684.

González de Juana, C., 1951. Introducción al estudio de la geologia de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(1): 119-146.

Kehrer, L., 1938. Some observations on the stratigraphy in the states of Táchira and Mérida, S. W. Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 4-66 (Engl. ed.).

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst. Ithaca, New York, 890 p.

Olsson, A. A. and Caster, K. E., 1937. Devonian fauna from Colombia, South America, (Abstract), *Geol. Soc. Am.*, Pr., 1936, p. 269-270.

Schuchert, C., 1936. Historical geology of the Antillean-Caribbean region, *John Wiley & Sons Inc.*; 811 p.

Weisbord, N. E., 1926. Venezuelan Devonian fossils, *Bull. Am. Paleont.*, 11(46): 62.

Weisbord, N. E., 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1ra. Edic. *Ministerio de Minas e Hidrocarburos*. Caracas.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)