

MESOZOICO

Estado Miranda

Referencia original: Beck, C.; D. Girard y P. De Wever, 1984.

Beck *et al.* (1984) utiliza informalmente este nombre para describir una secuencia de basaltos, brechas basálticas, sedimentos volcanodetríticos y otras rocas sedimentarias que afloran en el río Guare, entre las poblaciones de Tácata y Altagracia de la Montaña, estado Miranda. Bellizzia (1989, p. 6755) reúne y reinterpreta la información de Beck, indicando que esta secuencia podría representar una cobertura inicial de las ofiolitas de Loma de Hierro o más bien la base de la Formación Tiara. Van Berkel *et al.* (1989) realizan un estudio detallado de esta misma zona, pudiendo cartografiar dos asociaciones, una de rocas ofiolíticas que asignan al Complejo Ofiolítico de Loma de Hierro, y otra unidad de rocas metasedimentarias de muy bajo grado, que asignan a la Formación Paracotos, por consiguiente el nombre acuñado por Beck *et al.* (1984) resulta innecesario.

© **F. Urbani P., 1997**

Referencias

Beck, C., D. Girard y P. De Wever, 1984. Le "Volcano-sedimentaire du Río Guare", un element de la nape ophiolitique de Loma de Hierro, Chaîne Caraïbe Vénézuélienne. Comptes Rendus des Seances de l'Académie des Sciences, Serie 2: Mécanique-Physique, Chimie, Sciences de l'Univers, Sciences de la Terre, 299(7): 337-342.

Bellizzia, A., 1986. Sistema montañoso del Caribe - una cordillera alóctona en la parte norte de América del Sur. Mem. VI Congr. Geol. Venezolano, Barquisimeto, 10: 6657-68-36.

Van Berkel, D., M. Ostos y F. Yoris, 1989. Geología del área ubicada entre las poblaciones de Tácata y Altagracia de la Montaña, edo. Miranda. Geos, UCV, Caracas, (29): 97-107.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)