




TRIASICO - JURASICO

Colombia

Referencia original: O. Renz, 1960, p. 321.

Consideraciones históricas: Renz (1960), introdujo el término Formación Rancho Grande, para designar la unidad intermedia del Grupo Cojoro, en la parte sureste de la Península de La Guajira.

Rollins (1965), describió la unidad, incluyendo en ella la Formación Guasasapa, establecida por Renz como unidad basal del grupo. Geyer (1973 y 1977) sigue la subdivisión de Rollins. Mojica y Dorado (1987) mencionan la unidad al resumir la estratigrafía de la Guajira suroccidental.

Localidad tipo: La formación toma su nombre del caserío Rancho Grande en territorio colombiano, a unos 7 km al noreste de la población venezolana de Cojoro y a 2 km de la frontera. La sección tipo está en su vertiente meridional del cerro Vipana (Vitpana), a unos 4 km al noreste del Rancho Grande (Geyer, 1973).

Descripción litológica: En la descripción original de la formación, Renz describe areniscas duras, quebradizas y macizas, de color gris oscuro, en la parte inferior, seguidas por calizas fosilíferas color gris, limosas a arenosas, limolitas y areniscas de grano fino. En el tope de la formación se encuentran calizas gris azulado, intercaladas con lutitas negras fosilíferas. Rollins (1965) menciona además, sills riolíticos, flujos y diques en varios niveles en la localidad tipo, así como intercalaciones de lutitas duras y arcilitas en toda la secuencia (Geyer 1973).

Espesor: Renz (1960) le asigna un espesor de 240 m a la formación. Rollins (*op. cit.*) estima un espesor de 375 m, en el cual estaría incluido el espesor, no especificado, de la Formación Guasasapa de Renz.

Extensión geográfica: La Formación Rancho Grande aflora en el área de las serranías de Cojoro y Cocinas, así como al oeste de Punta Espada.

Contactos: Según la descripción original de Renz (*op. cit.*), la formación yace concordantemente sobre la Formación Guasasapa. De acuerdo con la versión de Rollins (1965) y Geyer (1973), el contacto inferior sería con el basamento granítico. En el tope, la unidad pasa concordantemente a la Formación Uipana.

Fósiles: Las calizas de la parte media de la formación, contienen pelecípodos y braquiópodos. En las lutitas negras de la parte superior, se encuentran ostrácodos y bivalvos pequeños. No se han publicado descripciones de dichas faunas.

Edad: Renz (*op. cit.*) consideró una posible edad triásico temprano para la unidad. Geyer (1973) al correlacionar el Grupo Cojoro con el Grupo Cocinas, le da una edad jurásica. Mojica y Dorado (1987) concluyen que la edad de la Formación Rancho Grande, iría del Triásico tardío al Jurásico temprano.

Correlación: La Formación Rancho Grande es correlativa probablemente de la Formación La Quinta. Hacia el oeste, correlacionaría con la parte inferior del Grupo Cocinas (Formación Cheterló?).

Paleoambientes: Renz (*op. cit.*) considera que la formación se depositó en un ambiente marino, "en parte lacustre o lagunal".

Sinonimias: Según Rollins (1965), la Formación Rancho Grande es sinónimo de las formaciones Guasasapa y Rancho Grande de Renz (1960).

© P. Jam L., 1997

Referencias

Renz, O., 1960-a. Remarks on the Barquisimeto Trough. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 155-160.

Renz, O., 1960-b. Guía de la excursión C-8. Andes nororientales. Barquisimeto-Barbacoas (Estado Lara). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 93-97.

Renz, O., 1960-c. Geología de la parte sureste de la Península de La Guajira (República de Colombia). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 317-347.

Rollins, 1965. Stratigraphy and structure of the Goajira Península, northwestern Venezuela and northeastern Colombia. Univ. of Nebraska Studies, *New Series*, (30): 102.

Geyer, 1973. ??????????????????????????????

Geyer, 1977. ??????????????????????????????

Mojica y Dorado, 1987. ??????????????????????????????

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)