




TERCIARIO (Plioceno) - CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estado Falcón

Referencia original: E. Mencher, H. J. Fichter, H. H. Renz, W. F. Wallis, H. H. Renz, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951, Cuadro de Correlación.

Consideraciones históricas: Mencher *et al.* (1951, Cuadro de Correlación) mostraron esta unidad como concordante por encima de la Formación San Gregorio, en Falcón Occidental. Stainforth (1962), recomendó su inclusión como miembro superior de la unidad. El Miembro Río Seco pertenece a la Formación San Gregorio, la cual consta de tres miembros en forma ascendente: miembros Vergel, Cocuiza y Río Seco.

Descripción litológica: Se caracteriza por limolitas, areniscas y conglomerados.

Espesor: El espesor del Miembro Río Seco alcanza los 142 m.

Contactos: El Miembro Río Seco que se encuentra suprayacente al Miembro Cocuiza se encuentra en contacto discordante con aluviones del Holoceno. Los conglomerados del miembro coronan las pequeñas cuevas impartiendo un carácter típico a la región.

Fósiles: no presenta fósiles.

Edad: De acuerdo a Gonzalez de Juana *et al.* (1980), la Formación San Gregorio se considera de edad Plioceno "más Joven" por sus relaciones estratigráficas, discordantes sobre el Miembro Algodones de la Formación Codore del Mioceno Tardío. Rey (1990) indica que la formación Codore se sedimentó en el Plioceno Temprano y Plioceno Medio (Miembro Algodones) y la Formación San Gregorio es mas joven que el Plioceno Medio, ubicándola desde finales del Plioceno Medio a la mayor parte del Plioceno Tardío, en base a sus relaciones estratigráficas, ya que no encontró fauna diagnóstica de edad. Según el L.E.V. (1970), el Miembro Cocuiza, de la Formación San Gregorio, infrayacente al Miembro Río Seco, es de edad Plioceno-Pleistoceno. Por lo tanto, la edad de la Formación San Gregorio se asume por su relación estratigráfica, discordante sobre el Miembro Algodones de la Formación Codore y estar recubierta discordantemente por aluviones del Reciente, por lo que los miembros medio y superior (Cocuiza y Río Seco) se pueden estimar de edad Plioceno Tardío-Pleistoceno Temprano.

Paleoambientes: Rey (1990) indica que el Miembro Río Seco representa una sedimentación de ríos entrelazados con facies proximales y distales, donde los conglomerados y arenas presentan estratificación cruzada festoneada, ocasionalmente masiva, indicando los depósitos del canal activo, mientras que las limolitas son facies de llanuras de inundación.

© J. Méndez B., 1997

Referencias

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Mencher, E., K. F. Dallmus, H. J. Fichter, C. Gonzalez de Juana, R. L. Ponte, H. H. Renz y P. de Schumacher, 1951. Cuadro de Correlación de las formaciones geológicas de Venezuela. En: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 37(4): 774-775.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robies, 1951. Resumen geológico, Cap I. p. 1-80, en: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Ter. Hidrocarb., *Min. Minas e Hidrocarburos*, Caracas.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. *Léxico Estratigráfico de Venezuela*. Segunda Edición, p. 167.

Rey, O., 1990. Análisis comparativo y correlación de las formaciones Codore y La Vela, Estado Falcón. *Tesis de Magister Scientiarum. Escuela de Geol. Min. y Geof. Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela.* 162 p.

Stainforth, R. M., 1962. Definitions of some news stratigraphic units in western Venezuela: Las Pilas, Cocuiza, Vergel, El Jebe, Tres Esquinas and Nazaret. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 5(10): 279-282.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)