

### CRETACICO

Estado Sucre

**Referencia original:** Yoris, 1985.

**Consideraciones históricas:** Yoris (1985-a) cita el hallazgo de un horizonte de 251 m de espesor de sedimentitas diferenciables, en la Formación Barranquín, por debajo del Miembro Venados, por Mendoza (tesis inédita). La secuencia consiste, de base a tope, de capas de micritas fosilíferas intercaladas con areniscas y limolitas, seguido de un tramo homogéneo de areniscas de grano variado, y lutitas limosas carbonosas. Sunrayacente, se halla una alternancia de arenitas de cuarzo a veces calcáreas, con biomicritas y bioesparitas dolomitizadas. Esta secuencia infrayace al Miembro Venados de la Formación Barranquín, en un sector al sureste de la carretera Casanay-Caripito, entre los caseríos San Antonio y Caño de Cruz. Su fauna no ha podido ser identificada por los micropaleontólogos, y por ello su edad se desconoce.

Véase [BARRANQUIN, Formación](#).

© *O. Macsotay y F. Yoris, 1997*

### Referencias

Yoris, F., 1985-a. Análisis petrográfico-estadístico de areniscas del Grupo Sucre (franja oeste del río San Juan, estados Sucre y Monagas) Venezuela nor-oriental. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 1307-1342.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)