

PRE-CRETACICO

Estado Nueva Esparta

Referencia original: H. H. Hess y J. C. Maxwell, 1949, p. 1859.

Hess y Maxwell (1949) distinguieron, dentro del Grupo Juan Griego, un intervalo inferior que llamaron "División Cuarzosa" y un intervalo superior, denominado "División de las Rocas Verdes" (Greenstone Division). Taylor (1960) estableció que esta última ocupa en realidad la base del grupo e introdujo para designarla el nombre de Anfíbolita de Paraguachí. Este nombre no ha tenido aceptación posterior, debido a que la complejidad petrológica de las rocas del intervalo, así como su carácter predominantemente esquistoso, no se ajustan a su clasificación como anfíbolita. Jam y Méndez A. (1962) y González de Juana (1968) denominaron el intervalo "Grupo de los Esquistos Verdes", término mejor ajustado a la petrología observada y a la designación original.

El Comité de Redacción del Léxico Estratigráfico de Venezuela considera que el término "Anfíbolita de Paraguachí" es inadecuado para designar esta secuencia tan compleja; el de "Grupo de los Esquistos Verdes", aparte de ser indeseable por no geográfico, conduce a confusión con la facies metamórfica del mismo nombre. Por estos motivos, se ha retenido el nombre original de Hess y Maxwell (1949) con categoría de informal, hasta que nuevos estudios establezcan una nomenclatura formal adecuada.

La unidad aflora en Margarita nororiental al norte de El Portachuelo, hasta la Playa de Pedro González por el noroeste y la región de Manzanillo por el noreste; no se han reconocido afloramientos de la unidad en la península de Macanao.

Litológicamente se distinguen varias unidades cuyas relaciones mutuas no se han determinado aún. En general, la unidad es un conjunto de esquistos de color verde (esquistos hornabléndicos y glaucofánicos y anfíbolitas), de grano fino a medio y foliación delgada, intercalados con gneis de grano fino. Taylor (1960), como también Hess y Maxwell (1949), señalaron los siguientes conjuntos mineralógicos: (1) esquistos feldespático (albita)-hornabléndico-clinozoisíticos; (2) esquistos cuarzo-hornabléndico-clinozoisíticos; (3) anfíbolitas hornabléndico-granatíferas; (4) gneis hornabléndico-clinozoisítico; (5) gneis hornabléndico-cuarzo-albítico-feldespático; (6) esquistos albítico-epidótico-clorítico-muscovíticos.

Taylor mencionó además una asociación de esquistos verdes metavolcánicos con metaftanitas negras, para la cual propuso el nombre de Miembro metavolcánico de Manzanillo de la Anfíbolita de Paraguachí, cuya posición no definió en el texto, pero que colocó en el tope de la secuencia en el mapa. Las Rocas Verdes exhiben localmente el grado metamórfico más alto observado en Margarita, correspondiente a la facies de la anfíbolita de Turner.

Referencias


González de Juana, C., 1968. Guía de la excursión geológica a la parte oriental de la Isla de Margarita (Estado Nueva Esparta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Guía, 30 p.

Hess, H. H. y J. C. Maxwell, 1949. geological reconnaissance of the Island of Margarita. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 60(12): 1857-1868.

Jam, L. P. y M. Méndez A., 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. *Soc. Cienc. Nat. La Salle, Mem.*, 22(61): 51-93.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita, Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., II: 838-893.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)