




TERCIARIO (Mioceno Temprano)

Estado Anzoátegui

Referencia original: A. H. Garner, 1926, p. 683.

Hedberg y Pyre (1944) llamaron "Miembro Dividive" a una subdivisión de la Formación Santa Inés; este nombre era sinónimo de las capas de San Mateo de Garner (1926) y homónimo de las calizas de Dividive del Mioceno de Falcón. Posteriormente, Hedberg (1950-a) incluyó las mismas capas en la Formación Quiamare como miembro superior sin designación. Mencher *et al.* (1951, Cuadro de Correlación) revivieron el nombre San Mateo y mostraron el intervalo con rango aparente de formación del Grupo Santa Inés. Young *et al.* (1956, Cuadro de Correlación) lo representaron como miembro superior de las tres subdivisiones de la Formación Quiamare, criterio que se ha mantenido.

El Miembro San Mateo, de unos 185 metros de espesor, se compone principalmente de limolitas calcáreas, areniscas y conglomerados, que forman la prominente fila de Dividive, al este de San Mateo. Debido a la gran variabilidad lateral de la Formación Quiamare, este miembro tiene una extensión horizontal limitada, y regionalmente es poco significativo.

Véase [**QUIAMARE, Formación**](#).

Referencias

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng., Trans.*, p. 677-684.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Mencher E., K. F. Dallmus; H. J. Fichter; C. González de Juana; R. L. Ponte; H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. *Cuadro de correlación de las formaciones geológicas de Venezuela*. En: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb., Caracas (en castellano e inglés). Reimpreso, 1950 en: Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., 2: 182. Reimpreso, 1951 en: Petrol. Interam., 9:(12): 26-29.(en castellano e inglés); 1953: en Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull., 37(4): 774-775.

Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. N° 2, 140 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the rio Querecual section of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 48(12): 1971-2024.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113, 369-373.



1st Ed. English



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)