

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: V. Mendoza, 1974, p. 313.

Consideraciones históricas: Mendoza (1974) introduce este nombre para designar unas rocas graníticas leucocráticas, de aspecto subvolcánico, que afloran en los alrededores del río Suapure, estado Bolívar.

Localidad tipo: Entre los poblados de El Budare y Pijiguao, a 3 km al oeste del paso de San Pedro en el río Suapure. (Hoja ????, esc: 1.100000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: El granito es de grano fino, leucocrático, masivo a moderadamente foliado, aspecto subvolcánico, hipantomórfico granular a xenomórfico, protoclástica, compuesto de cuarzo cataclástico (25%), feldespato potásico y perita (50%), plagioclasa Na + (20%), con cantidades pequeñas de máficos como biotita, clorita, epidoto y opacos y otros constituyentes menores como apatito, titanita y circón. Según el autor, este granito representa una facies transicional de grano fino del Granito de Santa Rosalía. Esta facies se observa generalmente hacia el borde de la masa granítica en contacto con la Formación Caicara y a veces toma el aspecto de un contacto transicional desde el granito de grano grueso de Santa Rosalía, al granito leucocrático de grano fino de San Pedro y a las volcánicas de Caicara, esta transición se observa en la localidad de la Mariposa (González de Juana *et al.*, 1980). por otra parte en la localidad de Bebederos el granito de San Pedro es claramente intrusivo en las volcánicas ácidas de la Formación Caicara y además se encuentran xenolitos de rocas riolíticas dentro del granito.

Extensión geográfica: Aflora en el área del río Suapure, en los alrededores de los poblados de San Pedro, Pijiguaos, Cerro Bebederos y en el camino La Mariposa y Pijiguao, Temblador.

Contactos: El Granito representa una facies transicional de grano fino del Granito de Santa Rosalía. Esta facies se observa generalmente hacia el borde de la masa granítica en contacto con la Formación Caicara y a veces toma el aspecto de un contacto transicional desde el granito de grano grueso de Santa Rosalía, al granito leucocrático de grano fino de San Pedro y a las volcánicas de Caicara. En Bebederos el granito es claramente intrusivo en cuarzolatitas de la Formación Caicara. En el área de la Mariposa el Granito de Santa Rosalía es texturalmente transicional con el de San Pedro.

Edad: Precámbrico Temprano. Una edad por método Rb/Sr en roca total para el Granito de San Pedro es de 1875 m.a. (Hurley *et al.* 1973, 1977), la cual corresponde con la del Granito de Santa Rosalía. Otra determinación Rb/Sr en roca total dió 1952 ± 71 m.a. Gaudette *et al.* (1977, en Moreno *et al.* 1977, p. 514).

Correlación: De acuerdo a la descripción de Mendoza (1974) se puede correlacionar con el Granito de Santa Rosalía (hay variación textural transicional) y con las intrusivas menores ácidas en el área del río Cuchivero.

© J. H. Rios, 1997

Referencias

Gaudette, H. E.; V. Mendoza; P. M. Hurley y H. W. Fairbairn, 1977. Geology and age of the Perguaza rapakivi Granite, Venezuela: *Geol. Soc. América Bull.* 89: 1335-1340.

González de Juana, C.; I. de Aroza y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 Tomos, 1031 p.

Hurley, P.; J. Kalliokoski; H. Fairbairn y W. Pinson, 1974. Progress report on the age of granulite facies rocks in the Imataca complex, Venezuela. *Conf. Geol. Interuayananas IX*, Ciudad Guayana, Estado Bolívar, p. 431-433.

Hurley, P.; H. Fairbairn; H. E. Gaudette; V. Mendoza; A. Espejo y C. Martín, 1977. Progress report on Rb-Sr age dating in the northern Guayana Shield. *II Cong. Latinoamericano de Geología*, 4: 3035-3044.

Mendoza V., 1974. Geología del área del río Suapure, parte noroccidental del Escudo de Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. *IX Cong. Geol. Inter-Guayanas*, p. 306-338.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)