




CRETACICO (Maastrichtiense Tardío) - **TERCIARIO** (Eoceno Tardío)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg, 1937-a, p. 257.

Consideraciones históricas: El Grupo Santa Anita fue descrito originalmente por Hedberg (1937-a) como Formación Santa Anita, para designar parte de los sedimentos expuestos a lo largo del río Querecual, cerca del Paso Santa Anita, en los alrededores del pueblo Bergantín, estado Anzoátegui. Hedberg (1937-a), subdividió a su Formación Santa Anita en los miembros San Juan, formado principalmente por areniscas, y Caratas, compuesto de areniscas, lutitas grises, limolitas y dolomitas. Hedberg y Pyre (1944), reconocieron un miembro intermedio, la lutita de Vidoño, nombrado de esta manera por el pueblo de Vidoño, localizado 6 km al sureste de Barcelona, estado Anzoátegui.

Liddle (1946, p. 280), siguiendo la sugerencia de Hedberg y Pyre (1944, p. 12), propuso el término Grupo Santa Anita, pero con solo dos miembros, San Juan y Caratas, mientras que Hedberg (1950-a, p. 1193-1194) propuso formalmente elevar la unidad al rango de grupo, con sus tres miembros, la Arenisca San Juan, la Lutita Vidoño y la Formación Caratas, en orden ascendente.

Salvador (1964-a), incluyó al Miembro Tinajitas en la Formación Caratas. Hedberg y Pyre (1944), introdujeron el término para definir el miembro basal de su Formación Merecure en el área de Barcelona.

Rosales (1960), Lamb (1964), Peirson (1965) y Campos y Osuna (1977), realizaron estudios litológicos y paleontológicos de los sedimentos que componen este grupo. Galea (1985-a), propuso formalmente incluir a la Formación Peñas Blancas como la unidad superior del Grupo Santa Anita, e incluir al Miembro Tinajitas como un miembro de esta formación, característico del área de Barcelona. De esta manera, el Grupo Santa Anita queda constituido, de base a tope, por las formaciones San Juan, Vidoño, Caratas y Peñas Blancas; en esta última se incluye al Miembro Tinajitas.

La extensión geográfica del grupo abarcaría desde las cercanías de Maturín, estado Monagas, al este (Di Croce, 1987), hasta la región de Clarines, en el estado Anzoátegui, al oeste (Galea, 1985-a).

Galea (1985) estudió detalladamente el grupo en el norte de Anzoátegui, en cuanto a su litología, bioestratigrafía, y paleoambiente, concluyendo que "Los sedimentos maastrichtiense tardío-eoceno medio del Grupo Santa Anita fueron depositados como una sola secuencia de abanico submarino de mar profundo, talud progradante y plataforma carbonática." Interpretó que el grupo pertenece a la misma provincia turbidítica del Cretácico Tardío-Paleógeno que la de los "surcos" de Barquisimeto y Guárico.

Localidad tipo: La localidad tipo del grupo Santa Anita se encuentra a lo largo del río Querecual, en las inmediaciones del paso Santa Anita. Este es el primer paso donde la carretera Barcelona-Bergantín cruza sobre el río. La Formación San Juan se localiza desde 150 m aguas arriba del paso Santa Anita, desde el contacto con la Formación San Antonio, infrayacente, hasta la desembocadura del caño San Juan en el mismo río Querecual. La Formación Vidoño tiene su localidad tipo en el valle del mismo nombre, en la carretera Barcelona-El Rincón, en las cercanías del pueblo Vidoño. La Formación Caratas tiene su localidad tipo desde el paso Santa Anita, en el río Querecual, hasta 600 m aguas abajo del mismo paso. La Formación Peñas Blancas tiene su localidad tipo en el cerro Peñas Blancas, al norte de la población de Clarines, estado Anzoátegui.

Véase [SAN JUAN, Formación](#); [VIDOÑO, Formación](#); [CARATAS, Formación](#).

© **F. Galea A., 1997**

(Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997)

Referencias

Campos, V. y S. Osuna, 1977. Geología de la región de Boca de Uchire. *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Mem. 2: 449-467.

Di Croce, J., 1987. ?????????????????????????????

Galea, F., 1985. Biostratigraphy and Depositional environment of the Upper Cretaceous Eocene Santa Anita Group, (North Eastern Venezuela). *Tesis MSc, Free University press*, Amsterdam, 115 pp., 31 pis., 4 enclosures.

Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the Río Querecual section of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 239-250.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the Eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-Eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Amer.*, Bull. 61(11): 1173-1216.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of north-eastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petról. Geol.*, Bull. 28(1): 1-28.

Lamb, J. L., 1964-a. The stratigraphic occurrences and relationships of some Mid-Tertiary *Uvigerinas* and *Siphogenerinas*. *Micropaleontology*, 10(4): 457-476. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(12): 379.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the Río Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Miner. y Petról.*, Bol. Inform. 7(4): 111-123.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad* (2nd. ed.), Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Peirson III, A. L., 1965-b. Geology of the Guárico Mountain front. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 8(7): 183-212.

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo-Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior Oriental de Venezuela. *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem. 2: 471-495.

Salvador, A., 1964-a. Proposed redefinition of the term "Tinajitas" in northeastern Venezuela. *Asoc. Ven. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(2): 53-64.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Altagracia de Orituco, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(3): 237-264.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (1st. ed.) J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 662 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, Río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 5(4): 89-108.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuela Basin. *Asoc. Ven. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(6): 153-202.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)