


**TERCIARIO** (Mioceno Medio - Tardío)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg y A. Pyre, 1944, p. 22.

Consideraciones históricas: El Miembro Salomón, fue publicado originalmente por Hedberg y Pyre (1944) como uno de los 8 miembros de su "formación (o grupo)" Santa Inés. Mencher *et al.* (1951-a,b, Cuadro de Correlación) mostraron al miembro como uno de los 6 miembros de su Grupo Santa Inés y elevaron a Quiamare al rango de Formación. Fue incluido como miembro de la Formación Quiamare en el cuadro de correlación de Young *et al.*, (1956), criterio mantenido por autores posteriores. La unidad posee 1.300 m de espesor en su área tipo, y consiste principalmente de arcilitas abigarradas de color gris oscuro, azul y verdoso, con suficientes capas duras de areniscas y conglomerados de guijarros fanáticos, como para sostener una topografía escabrosa. Según Peirson (1965-a) el miembro carece de los minerales de jarosita y yeso y no muestra los suelos de color rojo vivo que tiene el Miembro Revoltijo, siendo en general de aspecto menos marino que aquel. Las arcilitas se vuelven blandas y pegajosas cuando están mojadas. Tienen textura aspera por el contenido de limo y arenisca de grano fino a medio, localmente son calcáreas y finamente micáceas. Concreciones irregulares de arcilita ferruginosa "(clay-ironstone)" ocurren en toda la secuencia. Interestratificadas con las arcilitas como lentes de 1.5 m por 10 m, las areniscas son marrones, de grano fino, medio y grueso, limosas calcáreas, con algunas capitas de conglomerado guijarroso. Cerca del contacto con Revoltijo hay algunas lutitas moteadas de color gris, marrón, ligeramente yecíferas y jarosíticas, con niveles de megafósiles y areniscas blancas, finas, delgadas y calcáreas. El nombre proviene de la quebrada Salomón, afluente del río Aragua, a unos 8 km al suroeste del pueblo de Santa Inés, estado Anzoátegui. Considerado como de extensión horizontal limitada por el CVET (1970) y Gonzalez de Juana *et al.*, (1980), constituye el miembro de mayor extensión geográfica de la Formación Quiamare, según Vivas y Macsotay (1989), reconociéndose desde los alrededores de Santa Inés en el este, hasta Altagracia de Orituco, por el oeste. En Anzoátegui central, el Miembro Salomón suprayace al Miembro Revoltijo, e infrayace al San Mateo (Hedberg y Pyre, 1944; CVET, 1970). En el norte del estado, el Miembro Salomón presenta relación lateral-transicional y suprayacente con respecto al Miembro El Pilar (Vivas y Macsotay, 1989). De Sisto (1960) correlacionó el miembro en el campo Quiamare por eléctrofacies con el intervalo tope arena C-1/base arena F-3 de la Formación Oficina. De este miembro se han muestreado moluscos de ambiente marino litoral, de edad Mioceno Tardío basal (Macsotay en Campos y Osuna, 1977). El ambiente se considera marino-costero a continental subaéreo, con dominio de este último. Unidades como las Formaciones Bruzual, Murgua y Guaribito, son sinónimos por identidad litológica.

Véase [QUIAMARE, Formación](#); [BRUZUAL, Formación](#).

© O. Macsotay y V. Vivas, 1997

(Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997)

Referencias

- Campos, V. y S. Osuna, 1977. Geología de la región de Boca de Uchire. Geology of the Boca de Uchire region. Sociedad Venezolana de Geólogos, Caracas, Venezuela, *V Congreso Geológico Venezolano*, 1: 449-467.
- De Sisto, J., 1960. Correlation of the Santa Inés Group in northeastern Anzoátegui. Bol. Inform., *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 3 (5): 138-143 y 144-146.
- González de Juana, C., J. Iturralde, X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, 1a Ed., Caracas, Foninves 1: 415-1031.
- Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.
- Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951-a. Resumen geológico. (Edic. en español), En: *Convención Nacional del Petróleo*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb.: 1-80.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951-b. Geological Review. (Edic. en inglés). En: *National Petroleum Convention*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb.: 1-75.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Peirson III, A. L., 1965-a. Geology of north-central Venezuela. *Informe inédito*, Creole Petr. Corp., Corpoven, 337 p.

Vivas, V. y O. Macsotay, 1989. "Miembro El Pilar de la Formación Quiamare, ejemplo de Molasa Orogénica Neogena de Venezuela Nororiental. 17 pp., *Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica*, Mayo, 1988.

Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. N° 2, 140 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Alta gracia de Orituco, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(3): 237-264.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans., p. 677-684.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Mencher E., K. F. Dallmus; H. J. Fichter; C. González de Juana; R. L. Ponte; H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. Cuadro de correlación de las formaciones geológicas de Venezuela. En: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb., Caracas (en castellano e inglés). Reimpreso, 1950 en: *Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 2: 182. Reimpreso, 1951 en: *Petrol. Interam.*, 9:(12): 26-29.(en castellano e inglés); 1953: en *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(4): 774-775.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(6): 153-202.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113, 369-373.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)