


**PRECAMBRICO TARDIO**

Estados Mérida-Trujillo-Táchira

Referencia original: M. Bass y R. Shagam, 1960, p. 377.

Consideraciones históricas: Este término fue introducido por Bass y Shagam (1960), sin definición formal, para designar las rocas más antiguas que se conocen en los andes merideños, constituidas por gneises, esquistos y rocas graníticas. Este término fue considerado informal, debido a la definición inadecuada. Autores posteriores, Kovisars (1972), Grauch (1975), García, Canelón y Harder (1977), realizan estudios detallados de la unidad, lo que ha llevado a considerarla, como una unidad formal, con el rango de formación.

Localidad tipo: La localidad tipo de la formación está ubicada en la porción nororiental Glaciada, de la sierra nevada, al sur de Mérida. Hoja 5941 a escala 1:100.000 de Cartografía Nacional. Buenos afloramientos de la unidad, se observan en la carretera Mérida-Estanques; en la carretera La Grita-San José de Bolívar (páramo de Simosica), estado Táchira, y en la carretera Arbol Redondo-Boconó, estado Trujillo. Todas estas localidades, podrían ser tomadas como secciones de referencia.

Descripción litológica: La unidad está compuesta fundamentalmente por esquistos, gneises, anfibolitas y rocas graníticas.

Espesor: En la sección tipo, no se determinó el espesor. Canelón y Ramírez (1979), en la región del río Michay, determinaron espesores de hasta 2.000 metros.

Extensión geográfica: La unidad está ampliamente distribuida en los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas.

Expresión topográfica: Los afloramientos de la unidad, representan los rasgos topográficos más importantes de la Cordillera de Los Andes.

Contactos: El contacto inferior de la unidad, no se ha determinado. El contacto superior, se considera discordante con unidades Paleozoicas y Mesozoicas.

Fósiles: Ninguno.

Edad: Con base en las relaciones estratigráficas, y determinaciones radiométricas, se le asignó una edad Precámbrico Superior a esta unidad.

Correlación: Las rocas de la Formación Sierra Nevada, son similares a aquellas de la Serie Perijá (Hea y Witman, 1960), o Formación Perijá (Bowen, 1972). Se correlaciona además, con el Gneiss Bandeado de la Mitisus, en los andes venezolanos, sur centrales (Schubert, 1969). Kovisars (1972), postula posibles correlaciones con las rocas del Complejo de El Tinaco y de la Cordillera de la Costa.

Paleoambiente: Se postulan, los sedimentos originales de la Formación Sierra Nevada, como una secuencia espesa y algo monótona de pelitas y arenitas intercaladas, interestratificadas con margas (?) menores, asociación típica de la sedimentación miogeosinclinal.

Importancia económica: Se ha determinado la presencia de concentraciones de importancia económica de feldespatos, micas, granates y de cuarcitas ferruginosas.

Sinonimia: La Formación Sierra Nevada, es equivalente a la Facies Sierra Nevada.

© O. Odremán y A. Useche C., 1997

Referencias

Bass, M. N. y R. Shagam, 1960. Edades Rb/Sr. de las Rocas Cristalinas de los andes merideños, Venezuela, Mem., III Cong. Geol. Venez., Caracas, 1: 377-381.

Bowen, J. M., 1972. Estratigrafía del Pre-cretáceo en la parte norte de la Sierra de Perijá. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Mem., 2: 729-760.

Canelón, G. y C. Ramírez, 1979. Geología de la Región del Río Michay. Estados Barinas y Mérida. *Bol. Geol.*, Caracas, 13(25): 49-76.

García, J. R., G. Canelón y G. Harder, 1977. Geología de la región al sur de Bailadores, Estados Tachira y Mérida. Mem. *V Cong. Geol. Venez.*, 1: 415-448.

Grauch, R. I., 1975. Geología de la Sierra Nevada al sur de Mucuchíes, andes venezolanos: Una Región Metamórfica de Aluminosilicatos. *Bol. Geol.*, Caracas, 12(23): 339-441.

Hea. J. P. y A. B. Whitman, 1960. Estratigrafía y Petrología de los sedimentos Pre-cretácicos de la parte norte-central de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela, *III Cong. Geol. Venez.*, Mem., 1: 351-376.

Kovisars, L., 1972. Geología de la parte norte-central de los andes venezolanos. Mem., *IV Cong. Geol. Venez.*, 1: 817-860.

Schubert, C., 1970. Geología glacial del alto Río Santo Domingo, Andes venezolanos: *Bol. Infor., Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 13: 233-261.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Martín Bellizzia, M., 1960. Estudio petrográfico de rocas provenientes de los cerros El Rodeo, Tausabana y santa Ana. *III Cong. Geol. Venez.*, Mem., Caracas, 2: 729-742.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)