

**TERCIARIO** (Mioceno Medio)

Estado Falcón

**Referencia original:** P. Vallenilla, 1961, p. 29-69.

Vallenilla (1961) estableció esta zónula, que hizo coincidir exactamente con el Miembro Curazaíto de la Formación La Vela, cuyo espesor es de 120 metros en la sección de la quebrada El Muaco. Vallenilla reconoció 74 especies en la zónula, de las cuales la más importante es la titular (en nomenclatura actual, *Ammonia catesbyana*). La fáunula indica condiciones de aguas muy someras y de salinidad muy inferior a lo normal, posiblemente lagunas litorales. Vallenilla correlacionó la zónula estrechamente con la zónula de *Ephidium poeyanum-Reussella spinulosa* de Renz (1948), y le asignó una edad Tortoniense Tardío.

**Referencias**

Renz, H. H., 1948. Startigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Vallenilla L., P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipos, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(12): 29-78.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces