

PRECAMBRICO TEMPRANO

Estado Bolívar

Referencia original: J. Kalliokoski, 1965-c, p. 82.**Consideraciones históricas:** Kalliokoski (1965-c) introdujo este término para designar la unidad más joven de su Serie Real Corona, suprayacente a la Cuarcita de Námpares.**Descripción litológica:** La unidad consiste de una arenisca impura cizallada, de grano grueso, cuyos clastos han sido deformados a formas de unos 2 mm. por 4 mm. y alrededor de ½ mm. de espesor, embebidos en una matriz filítica de color gris. En algunos sitios, el tamaño original del grano puede haber sido casi conglomerático, pero en otros el grano era bastante fino, aún inicialmente. En sección fina, la variedad más gruesa esta intensamente alterada agregados de grano fino de anfíbol incoloro, una clorita muy fina y epidoto subordinado. El grado de metamorfismo es de la facies del esquisto verde.**Extensión geográfica:** La unidad aflora al oeste de Námpares en la margen oriental del río Aro, donde se observa en el flanco occidental del gran sinclinal este-oeste que comienza en la zona de La Flor, estado Bolívar y forma la Fila de las Cordilleras. Se ubica en el municipio autónomo Heres, hoja de Cartografía Nacional "Peramantal" N° 7338 a escala 1:100.000.**Sinonimia:** Kalliokoski (1965-a) estableció la sinonimia de este término con la subunidad Wacke, término indeseable por no geográfico, de su Formación Real Corona.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

ReferenciasKallikoski, J., 1965-a. Geology of north-central Guayana Shield, Venezuela. Geol. Soc. Amer., Bull., 76(9): 1027-1050. Resumen (1965) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(11): 328-329.Kallikoski, J., 1965-c. Geología de la parte norte-central del Escudo de Guayana. Venezuela. *Bol. Geol.* Caracas. 7(13): 29-104.[Enviar Comentarios](#)**2a Edición LEV****Comentarios Recibidos**[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)