

TERCIARIO (Mioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 72-74.

H. H. Renz (1948) definió esta zónula en la parte superior del Grupo Agua Salada, correspondiente a parte del Miembro Huso de la Formación Pozón. Consideró que el conjunto de foraminíferos indicaba influencia de factores más bien ecológicos, concepto confirmado posteriormente por Blow (1959). Su equivalente ha sido mencionado en la parte superior de la Formación Caujarao (Petzall, 1959; Vallenilla, 1961). Los citados autores la atribuyen al Mioceno Medio, pero los criterios modernos indican una edad Mioceno Tardío.

Véase [AGUA SALADA, Grupo](#).

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Petzall, C. K. de, 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 2(10): 269-320.

Renz, H. H., 1948. Startigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Vallenilla L., P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipos, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(12): 29-78.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces