




Estado Cojedes

Consideraciones históricas: Martín (1961), introdujo el nombre original de Riolita de Casupal que posteriormente (1989), sustituyó por el de Miembro Tirado, debido a que el término geográfico

original era inválido por homonimia con la Formación Casupal en el estado Falcón. La subunidad corresponde a la porción intermedia de la Formación Riolítica Teresén, que a su vez forma parte del Grupo Volcánico de Guacamayas, en el macizo de El Baúl, estado Cojedes.

El miembro consiste de riolitas de color azul grisáceo, moteado en amarillo metálico, densas, afaníticas, con fracturas subconcoidea a irregular, en flujos individuales de hasta 30 m de espesor, asociadas con brecha volcánica, posiblemente de falla, que las suprayacen, y consisten de fragmentos de lava, filitas rojas y escasos cristales. Mineralógicamente la roca consiste esencialmente de vidrio vesicular, microlitos de feldespato, sílice microcristalina y cristales esporádicos de sanidina. La unidad, tiene amplia distribución en la parte central de la fila de Guacamayas, en la región de Casupal, estado Cojedes. En su localidad tipo suprayace concordantemente al Miembro Corcovado.

© *P. Moticska N., 1997*

Referencias

Martín Bellizzia, C., 1961. Geología del Macizo de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol.*, Publ. Esp. N° 3, 4: 1463-1530.

Martín Bellizzia, C., 1989. ???

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada veces