




PALEOZOICO TARDIO

Estados Mérida y Táchira

Referencia original: R. Shagman, 1969, p. 935-938.

Consideraciones históricas: El nombre de Tostosa fue propuesto por Shagam (1969), para describir afloramientos de rocas litológicamente similares a las de la Formación Bella Vista, denominándolas Facies Tostosa, siendo ascendida al rango de formación por Canelón (1976). Benedetto (1982) la incluye en la Zona 3, de su zonación tecto-estratigráfica del noroeste de América del Sur. Pimentel de Bellizzia, A. Bellizzia y C. Ulloa, le dan la denominación de Formación Tostós, como parte integrante del núcleo ígneo metamórfico del orógeno andino junto al Complejo Iglesias, Mucuchachí, El Aguila, Cerro Azul, Los Torres y Río Momboy, excluyéndola además del Paleozoico temprano y/o del Precámbrico tardío. Bellizzia y Pimentel (1994) le dan un tratamiento similar, pero integrándola al Terreno Mérida con el nombre de Asociación Tostós, es decir, una unidad litodémica.

Localidad tipo: Sección expuesta en la parte baja del río Tostosa, al sur de la falla de Boconó, distrito Campo Elias, estado Mérida. Hoja 5941. Escala 1:100.000 de Cartografía Nacional. Canelón (1970), sugiere dos secciones de referencia: la primera de ellas, ubicada entre el sitio de La Victoria y el pueblo de Mesa de Bolívar, y la segunda, entre el caserío del Amparo y el sitio de La Roca (estado Mérida).

Descripción litológica: La Asociación Tostós constituye una secuencia de sedimentos metamorfizados, formados por pizarras, filitas, esquistos, gneises de grano fino, rocas silíceas masivas y anfibolitas. Las litologías predominantes son las filitas y esquistos, seguidos por rocas silíceas masivas, pizarras, gneises y anfibolitas. En el campo, las rocas foliadas presentan una serie de características comunes, tales como: colores verdoso a gris claro, grano fino, fuertemente deformadas y muy silíceas; las rocas silíceas masivas son de grano fino a medio y con foliación incipiente. La formación, está intrusionada por numerosos cuerpos graníticos pequeños y dos plutones graníticos denominados Granodiorita de Pueblo Hondo y Granito de la Victoria. Pequeños diques tabulares de composición anfibólica intrusionan a la formación en varios lugares.

Espesor: Debido a la fuerte deformación y complejidad tectónica del área, el espesor exacto no puede ser medido, pero en base a los afloramientos observados, se puede estimar un espesor de 2.000 m.

Extensión geográfica: Los afloramientos de la Asociación Tostós, al norte de la falla de Boconó, se extienden desde aproximadamente 4 km al noroeste de La Grita, en la carretera del páramo de La Negra a la población antes mencionada. También aflora en el páramo de La Negra. Otra zona de afloramiento importante es la que se encuentra al norte de la localidad de San Simón, pasando por Zea y extendiéndose hacia el este, hasta la cercanía del caserío Siloe. Otra franja se extiende desde la carretera Tovar-Santa Cruz de Mora, hasta la localidad de Estanques, continuando hacia el este en las quebradas Anís, Las Casas, en los cores de la carretera al Vigía y al sur de Lagunillas, hasta el oeste de Ejido.

Expresión topográfica: Los afloramientos asociados a aquellos de las formaciones Sierra Nevada y Bella Vista, determinan los rasgos topográficos más significativos de la Cordillera de los Andes.

Contactos: La Asociación Tostós suprayace discordantemente a la Formación Sierra Nevada (páramo de La Negra), e infrayace discordantemente a formaciones Paleozoicas (Sabaneta) y cretácicas (Río Negro).

Fósiles: No se han identificado hasta el momento.

Edad: De acuerdo a determinaciones de campo realizadas por Shagam (1969), el mismo le asigna una edad de Precámbrico Superior. Posteriormente, Canelón y García basados en relaciones de campo, le asignan una edad de Paleozoico inferior. Bellizzia y Pimentel (*op. cit.*) basados en semejanzas con la Asociación Mucuchachí, le asignan una edad Paleozoico Tardío.

Correlación: Las correlaciones propuestas recientemente son con las asociaciones Mucuchachí, Los Torres, Cerro Azul, El Aguila y Río Momboy de los Andes venezolanos.

Paleoambientes: La distribución geográfica de los afloramientos de rocas de la formación, sugiere que éstos fueron acumulados principalmente en una cuenca larga y relativamente estrecha, en aguas poco profundas, lejos de corrientes activas y de la acción de las olas. La presencia de abundante grafito y pirita, en los metasedimentos, sugiere una deposición en un ambiente fuertemente reductor.

Importancia económica: Ninguna.

Sinonimia: La Asociación Tostós es equivalente a las facies Tostosa (Shagam, 1969) y a la Formación Tostós (Grauch, 1975).

© O. Odremán y A. Useche C., 1997

Referencias

Bellizzia, A. y N. Pimentel, 1994. Terreno Mérida: Un cinturón alóctono herciniano en la Cordillera de Los Andes de Venezuela. *V Simposio Bolivariano. Expl. Petrol.* Cuencas Subandinas. Memoria: 271-290.

Beneddetto, J. L., 1982. Las unidades Tecto-Estratigráficas paleozoicas del norte de Sudamérica, Apalaches del Sur y Noroeste de Africa: Comparación y discusión. *V Congreso Lat. Geol.* Buenos Aires.

Canelón, G., 1976. Geology of the área de Mesa Bolívar-La Grita, states Mérida and Táchira, Venezuela Andes: *M.S. Thesis, Michigan Technological University*, p. 84.

Canelón, G. y R. García, 1977. Consideraciones sobre rocas del Paleozoico Inferior, Formación Tostosa, en el flanco norte de la Cordillera de los Andes. *V Cong. Geol. Venezolano.*, Caracas, Mem., 1: 227-252.

Grauch, R. I., 1975. Geología de la Sierra Nevada al sur de Mucuchíes, andes venezolanos: Una Región Metamórfica de Aluminio silicatos. *Bol. Geol.*, 12(23), M.M.H.

Marechal, P., 1983. Les Temoins de Chaîne Hercynienne Dans le Noyau Ancien Des Andes de Mérida (Venezuela). Structure et Evolución Tectonometamorphique. *These de Doctorat de 3 eme cycle. Universite de Bretagne Occidentale.* Brest 1983.

Pimentel de Bellizzia, N.; A. Bellizzia y C. Ulloa, 1992. Paleozoico inferior: una síntesis del Noroeste de América del Sur: Venezuela, Colombia y Ecuador. *Mem. Conf. Internac. Paleozoico.* Inf. De Ibero-América, Univ. De Extremadura, España, p. 203-224.

Shagam, R., 1969. Geología de los andes centrales, Venezuela (Resumen). *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, M.E.M., 2: 935-938.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)