




NEOGENO (Plioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: A. L. Payne, 1951, p. 1861.

Consideraciones históricas: Payne (1951) introdujo el nombre de Formación Tucupido, para describir depósitos de playa y marinos de aguas someras, localizados en una estrecha franja al norte de campo

Cumarebo; propuso la localidad tipo de la unidad, e incluyó bajo esta nomenclatura, las Capas de Barranquita y la Caliza de Puerto Cumarebo, descritas por Suter (1937), entre Tucupido y Puerto Cumarebo.

Giffuni (1988), ofrece una detallada descripción litológica y del contenido fosilífero de la Formación Tucupido en sus afloramientos de la región de Tocópero-Tucupido. Giffuni *et al.* (1992) interpretan la estratigrafía secuencial de la unidad.

Localidad tipo: Payne (1951) designó la localidad tipo entre Tucupido y La Providencia (Santa Rosa en los mapas modernos). Hoja 6350, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La unidad consiste en calizas con algas, intercaladas con calizas arenosas y conglomeráticas; localmente contiene arcillas verdosas gris azul, con intercalaciones de areniscas, capas con ostras y *Pecten* (Suter, 1937; Payne, 1951). Giffuni (1988) caracteriza a la Formación Tucupido como constituida por areniscas calcáreas y calizas arenosas interestratificadas con lutitas limosas y margas. Las lutitas son de color gris, compactas y masivas; a veces ligeramente laminadas, calcáreas y conchíferas; las margas son de color marrón rojizo, con abundantes niveles de moluscos; las areniscas calcáreas, de color marrón, son frecuentes y forman pequeños acantilados cerca de la costa; son resistentes y fosilífera; localmente, en la costa, aflora una caliza conglomerática, marrón grisácea, con cantos hasta de 1 cm de diámetro.

Espesor: Payne (1951) menciona un espesor máximo de 530 m (1600 pies). Giffuni (1988) midió 340 m en su área de estudio.

Contactos: Payne (1951) indica un contacto inferior discordante con la Formación El Veral. Giffuni (1988) no observa la discordancia en el campo, aunque no niega su presencia. Giffuni *et al.* (1992) colocan el contacto inferior como discordante. El contacto superior es discordante con depósitos cuaternarios.

Extensión geográfica: Se reconoce en una franja costera desde Puerto Cumarebo hasta la desembocadura del río Ricoa, estado Falcón.

Fósiles: Giffuni (1988) menciona la presencia de conchas de moluscos, especialmente bivalvos (*Pecten codorensis* y *Amonia* cf. *A. simplex*) y algunos gasterópodos (*Turritella* sp.), además de algas calcáreas, briozoarios y cirrípedos. Giffuni (1988) incluye amplia información acerca de la identificación y distribución de los foraminíferos de la Formación Tucupido. En términos generales, del 30 al 40% de los foraminíferos son planctónicos, el 9% son bénticos de pared aglutinada, 3 a 5% de pared calcárea imperforada y 50% de pared calcárea perforada.

Edad: Según Giffuni (1988), el conjunto de foraminíferos planctónicos identificados determinan una edad Plioceno Medio, Zona de *Pulleniatina obliquiloculata* (Stainforth *et al.*, 1975) o Zona de *Globorotalia miocenica* (Bolli y Saunders, 1985) o zonas N20 y N21 (Blow, 1969). Modernamente, el Plioceno se subdivide en Temprano y Tardío, quedando estas zonas dentro del Plioceno Tardío.

Correlación: La Formación Tucupido se correlaciona parcialmente hacia el este con la Formación Punta Gavilán; hacia el oeste, con parte de la Formación San Gregorio (Giffuni, 1988).

Paleoambiente: De acuerdo a Giffuni (1988), el contenido fósil sugiere una sedimentación en una plataforma interna en condiciones no restringidas, en mares tropicales, entre los 5 y 40 m de profundidad, con posibles influencias de aguas dulces. Giffuni *et al.* (1992) indican que la Formación Tucupido representa una parte del

sistema de cuña progradante de bajo nivel (LSW), con una transgresión hacia el tope. La discordancia en la base de la unidad (SB=3,8 Ma) es muy evidente.

© **E. Cabrera y G. Giffuni, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Blow, W. H., 1969. Late Middle Eocene to Recent planktonic foraminiferal biostratigraphy, *I International Conference on Planktonic Microfossils*, proc., 1: 199-422.

Bolli, H and Saunders, J.B., 1985. Oligocene to Holocene low latitude planktic foraminifera en Bolli, H.M., Saunders, J.B. and Perch-Nielsen, K. (eds) (1985) *Plankton Stratigraphy*. Cambridge Earth Science Series. p: 155-262.

Giffuni, G., 1988. Edad de la Formación Tucupido en el área de Tocópero, Distrito Zamora, Estado Falcón. *Bol. Soc. Venez. Geol.*, 32 en prensa.

Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 46: 7-15.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil fields, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Stainforth, R. M., J. L. Lamb, H-P. Luterbacher, J. H. Beard y R. M. Jeffords, 1965. Cenozoic planktonic foraminiferal zonation and characteristics of index forms, *University of Kansas Paleont. Contrib.*, 62: 1-425.

Suter, H. N., 1937-a. Notas Geológicas sobre la Formación Punta Gavilán de la Región Oriental del Estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.* Caracas, 1(2-4): 287-297.

Suter, H. N., 1937-b. Geologic notes on the "Punta Gavilán" Formation and on the eastern part of Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 269-279 (ed. en inglés).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)