

NEOGENO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: A. L. Payne, 1951, p. 1857.

Las arenas de Turaguapo conforman el cuerpo de areniscas más antiguo de la Formación Ricoa de Payne (1951). La Formación Ricoa de Payne (1951) consiste esencialmente de arcillas y lutitas y contiene tres cuerpos de arenas lenticulares, que de más antiguo a más joven son: Turaguapo, Solito y Las Lomas. De acuerdo al concepto de Díaz de Gamero (1985b), esta formación es parte de la Formación Agua Salada, siendo los cuerpos arenosos, como Turaguapo, unidades informales dentro de ella, en el área al sur de Cumarebo. Payne (1951) no presenta ninguna descripción detallada, ni espesor. Tan solo menciona que las arenas se lenticularizan o pasan a lutitas en dirección norte, noreste y este, de acuerdo a la evidencia de campo y subsuelo. La edad se considera Mioceno Temprano por su posición estratigráfica, más joven que la Formación San Luis y por debajo de las arenas de Solito, ya que no existe ningún estudio paleontológico de la unidad.

Véase [RICOA, Formación](#); [AGUA SALADA, Formación](#).

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1985-b. Estratigrafía de Falcón nororiental, VI Cong. Geol. Venez., Mem., 1: 454-502.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull., 35(8): 1850-1878.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, Bol. Geol. (Venezuela), Publ. Esp. 1: 1-728. (Ed. en inglés)

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. I Congr. Venez. Petról., Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)