

**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

Referencia original: A. Reid, 1974, p. 348.

Consideraciones históricas: Reid (1972) introdujo este término para designar la Formación media superior del Grupo Roraima ubicado al sureste de Venezuela, municipio Gran Sabana, estado Bolívar, entre las regiones de Santa Elena de Uairén y Monte Roraima.

Localidad tipo: No ha sido seleccionada todavía.

Descripción litológica: Secuencia de ftanitas, limolitas y arcosas rojas. Comienza en su base con un conglomerado de 10 m de espesor que grada hacia arriba a una sección arcósica. Las arcosas están bien cementadas y exhiben localmente estratificación cruzada pobremente desarrollada. Por encima se encuentra areniscas cuarzosas friables con abundante estratificación cruzada. La unidad contiene varias capas de ftanita y jaspe a través de todo su espesor. Martín y Bellizzia (1961) identificaron los jaspes rojos como tobas vítreas por estar constituidas de partículas de vidrio en forma de Y, media-luna, fibras, filamentos, etc., con vesículas, así como escasos fenocristales corroídos de cuarzo y feldespatos. Algunas de estas capas presentan estratificación cruzada y pueden representar limolitas silicificadas como lo interpretó Bellizzia (1957). El afloramiento más resaltante se encuentra ubicado junto a la carretera que va hacia Santa Elena de Uairén en la "Quebrada del Jaspe", donde presenta unos 12 m de espesor.

Espesor: Reid (1972), en su columna estratigráfica del Grupo Roraima, indica un espesor de 250 metros para la unidad.

Contactos: Suprayace concordantemente a la Formación Cuquenán e infrayace a la Formación Matauí.

Edad: Precámbrico. (Véase: Grupo Roraima).

Paleoambientes: Representa depósitos de origen fluvial y de delta de pequeñas dimensiones.

Importancia económica: Esta formación no reviste importancia desde el punto de vista geoeconómico, aún cuando los jaspes podrían ser de interés como material ornamental.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Bellizzia, A., 1957. Consideraciones petrogenéticas de la provincia migmatítica de Roraima (Guayana venezolana). *Bol. Geol.*, Caracas, 4(9): 53-81.

Martín Bellizzia, C. y A. Bellizzia, 1961. Columna estratigráfica provisional de la Guayana venezolana. *Proc. Vth. Inter-Guiana Geol. Conf.*, Georgetown, 1959, p. 29-31.

Reid, A. R., 1974. Stratigraphy of the type área of the Roaraima Group, Venezuela. *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar, p. 343-354.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)