

CRETACICO MEDIO

Estado Táchira

Este nombre, introducido originalmente por Sievers (1888), fue empleado antiguamente para designar las capas inferiores, principalmente clásticas, de la secuencia cretácea en Venezuela occidental. El término era aproximadamente sinónimo de la Formación Tomón, y, como éste, cayó en desuso al imponerse una subdivisión más precisa del Cretáceo. Pierce (1960) revivió el término en la cuenca de Barinas para designar todos los sedimentos cretácicos, compuestos principalmente por areniscas y conglomerados, infrayacentes a la Formación Navay. Kiser (1961), al comentar el trabajo de Pierce, recomendó desechar el nombre de Formación Uribante. Gaenslen (1962) en comentarios adicionales, señaló que en Barinas, el "Grupo" Uribante corrientemente es susceptible de división en las formaciones Río Negro, Apón, Aguardiente y Escandalosa, por lo cual el término es innecesario. Merece destacarse, sin embargo, que en Colombia oriental se mantiene aún el uso introducido por Notestein *et al.* (1944), o sea, la división de la Formación Uribante en los Miembros Tibú, Mercedes y Aguardiente.

Referencias

Gaenslen, G., 1962. A discussion of the Cretaceous stratigraphy of the southwest Barinas mountain front. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(3): 65-74.

Kiser, G. D., 1961. Review of the Cretaceous stratigraphy of the southwest Barinas mountain front, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(11): 335-359.

Notestein, F. B., Hubman, C. W. y Bowleer, J. W., 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South América. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 55(9): 1165-1216.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 214-276.

Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida, nebst Bermerkungen über das Karibische Gebirge. *Geogr. Abhand* (Penck), 3(1): 238.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

González de Juana, C., 1951-b. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo III: Las formaciones mesozoicas en Los Andes venezolanos y n la subcuenca del Lago de Maracaibo. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(2): 195-216.

Kehrer, L., 1937-a. Algunas observaciones en capas cretáceas y preretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 49-73.

Kehrer, L., 1939-a. Discussion: Geology of central Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 23(5): 699-704.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, Verenig. Schweiz. *Petról. Geol. und Ing.*, Bull., 20(59): 27-60.

Maync, W., 1949-1950. The foraminiferal genus *CHOFATELLA* Schlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean region (Venezuela, Cuba, México and Florida). *Eclog. Geol. Helv.*, 42: 529-547.

Maync, W., 1953. *Pseudocyclammina hedbergi* n. sp. from the Urgo-Aptian and Albian of Venezuela, *Cushman Found. Foram. Res.*, Contrib., 4(3): 101-103.

Mencher, E., Fichter, H. J., Renz, H. H., Wallis, W. E., Renz, H. H. Patterson, J. M. and Robie, R. H., 1953. Geology of Venezuela and its oil fields, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, 37(4): 690-777.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-1893. *Geogr. Gresell. Hamburg*, Mitt., 12: 327.

Staff of Caribbean Petroleum Company, 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell Group in western Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(4): 517-628.

Sutton, F. A., 1946. Geology of the Maracaibo Basin, Venezuela: *Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Tomalin, W. G. C., 1938-a. La estratigrafía de las formaciones cretáceas en las cercanías del valle del Río Carache, Estado Trujillo, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 11-20.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)