




TERCIARIO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 38-44.

En su estudio del Grupo Agua Salada de Falcón, Renz (1948) estableció esta zona para incluir la parte basal del grupo y también la parte superior de la Formación Guacharaca, infrayacente. Renz señaló que son muy pocas las especies de foraminíferos restringidas a la zona, pero la presencia de "*Uvigerinella*" *sparsicostata* y *Siphogenerina smith* es típica. (Según Lamb, 1964, estas dos especies son sinónimas). Renz dividió la zona en las subzonas de *Bolivina alazanensis* (inferior) y *Ammobaculites* cf. *stratheamensis* (superior), pero no especificó la diferenciación entre ambas.

En estudios posteriores del Grupo Agua Salada, Blow (1959) señaló que la parte superior de la Zona de "*Uvigerinella*" *sparsicostata* corresponde a la Zona de *Catapsydrax dissimilis* y base de la Zona de *C. stainforthi*.

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Lamb, J. L., 1964-a. The stratigraphic occurrences and relationships of some Mid-Tertiary *Uvigerinas* and *Siphogenerinas*. *Micropaleontology*, 10(4): 457-576. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(12): 379.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the rio Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(4): 111-123.

Renz, H. H., 1948. Startigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)