




TRIASICO - JURASICO

Colombia

Referencia original: O. Renz, 1960, p. 321.

Consideraciones históricas: El término Formacion Uipana fue introducido por Renz (1960), para designar la unidad superior del Grupo Cojoro. Rollins (1965) y Geyer (1973) aceptaron dicha unidad, aunque con discrepancias respecto al ambiente sedimentario. Mojica y Dorado (1987) citaron la formación en su resumen del desarrollo del Jurásico, en la península de la Guajira.

Localidad tipo: Cresta del cerro Uipana, en la parte sureste de la península de la Guajira. El cerro Uipana (o Uitpana) ubicado en territorio colombiano, está situado a unos 11 km al noreste de la población fronteriza venezolana de Cojoro, en la costa oeste del golfo de Venezuela.

Descripción litológica: Renz (*op. cit.*) describe la litología de la formación como "... areniscas gruesamente estratificadas, de grano medio a grueso y color gris claro, con vetillas de guijarros y capas de conglomerados". Los conglomerados contienen guijarros de cuarzo rosado de 1 a 2 cm de diámetro. Las areniscas muestran estratificación cruzada.

Espesor: El espesor de la Formación Uipana es de más de 550 m.

Extension geográfica: La formacion aflora en la serranía de Cojoro y en el flanco sur de la serranía de Cocinas. En el lado venezolano, aflora en pequeñas elevaciones en la llanura entre la frontera y la costa del golfo.

Contactos: Según Renz (*op. cit.*), la Formación Uipana yace concordamente sobre la Formación Rancho Grande, sin embargo, Rollins (1965) considera el contacto discordante en base a la presencia de guijarros de las calizas de Rancho Grande, en los conglomerados de la base de la formación. En el tope, la Formación Uipana yace bajo la Formación Palanz, del Cretácico.

Fósiles: Renz (*op. cit.*) menciona restos de plantas y un tronco árbol silicificado, de 2 m de largo.

Edad: Por su posición estratigráfica respecto a la Formación Rancho Grande infrayacente, se le ha asignado una probable edad jurásica a la Formacion Uipana (Mojica y Dorado, 1987).

Correlación: Según Geyer (1973 y 1977), la Formación Uipana correlaciona con la parte superior del Grupo Cocinas (Formacion Cuisa).

Paleoambientes: Renz (*op. cit.*) interpreta a la Formación Uipana, como representativa de un ambiente lagunal o terrestre, correspondiente a la fase regresiva del ciclo sedimentario. Por otra parte, Rollins (*op. cit.*) la considera depositada en un ambiente de playas marinas.

© P. Jam L., 1997

Referencias

Geyer, 1973. ??????????????????????????????

Geyer, 1977. ??????????????????????????????

Mojica y Dorado, 1987. ??????????????????

Renz, O., 1960-a. Remarks on the Barquisimeto Trough. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 155-160.

Renz, O., 1960-b. Guía de la excursión C-8. Andes nororientales. Barquisimeto-Barbacoas (Estado Lara). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 93-97.

Renz, O., 1960-c. Geología de la parte sureste de la Península de La Guajira (República de Colombia). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 317-347.

Rollins, 1965. Stratigraphy and structure of the Goajira Península, northwestern Venezuela and northeastern Colombia. Univ. of Nebraska Studies, *New Series*, (30): 102.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1era. Edición. *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 664 p.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)