

**PRECAMBRICO**

Territorio Federal Amazonas

**Referencia original:** G. Ascanio y W. Scherer, 1989.

**Consideraciones históricas:** Ascanio y Scherer (1989) introdujeron el término Formación Unturán, para designar a las areniscas continentales metamorfizadas más antiguas que el Grupo Roraima, identificadas en el valle del río Maraca, cubriendo una extensión de 11.000 km<sup>2</sup>. Aunque la descripción de la unidad es bastante completa, se incluye como informal, hasta disponer de mayor información.

**Localidad tipo:** Ascanio y Scherer (*op. cit.*) designaron como sección tipo, la que aflora al sur del helipuerto y campamento de Unturán, al suroeste de la sierra del mismo nombre, hasta el río Siapa, afluente del Casiquiare, en el extremo sur del Territorio Federal Amazonas, Departamento (Hoja 7120, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

**Descripción litológica:** La formación está constituida por una secuencia monótona de capas de arenisca blanca, de grano muy fino a fino, localmente mediano, bien escogidas, redondeadas y de aspecto sacaroideo. Están bien cementadas y localmente recristalizadas, presentando numerosas vetas de cuarzo lechoso y cuarzo policristalino o fanita blanca. Localmente, presenta manchas de óxido de cobre y raramente de óxido de hierro. Meteorizan con color gris oscuro.

**Espesor:** En la sección tipo, la formación tiene unos 300 m de espesor.

**Extensión geográfica:** Ascanio y Scherer (*op. cit.*) indican afloramientos de la formación, en las serranías de Unturán, Maraca, Maraquita e Idige, al norte de la localidad tipo, en el Territorio Federal Amazonas.

**Contactos:** La Formación Unturán yace discordante sobre el Complejo Granítico Amazónico, en el valle del Maraca y encima de las rocas volcánicas y plutónicas del Grupo Cuchivero, en la serranía de Unturán. El contacto superior, supuestamente con el Grupo Roraima, no ha sido definido.

**Fósiles:** No se han encontrado.

**Edad:** Según Ascanio y Scherer (*op. cit.*), la Formación Unturán puede tener una edad comprendida entre los 600 y 1.900 m.a., en base a su posición estratigráfica sobre el Grupo Cuchivero (1.900 m.a.) y bajo el Grupo Roraima (1.600 - 600 m.a.)

**Correlación:** No se ha establecido aún la correlación con otras unidades.

**Paleoambiente:** Las areniscas de la Formación Unturan parecen corresponder a un ambiente continental. El proceso de cementación y cristalización, ha borrado los indicios de la estratificación.

© P. Jam L., 1997

**Referencias**

Ascanio, G. y W. Scherer, 1989. Reconocimiento geológico del área de Tapirapécó. Territorio Federal Amazonas. VII Congr. Geol. Venez., Barquisimeto, Estado Lara, 1: 41-56.

Enviar Comentarios



**Comentarios  
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)