


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

Referencia original: N. Benaím, 1997, en prensa.

Consideraciones históricas: Benaím (1997) propuso el término para designar una secuencia de rocas volcánicas, generalmente lavas andesíticas, intercaladas con algunas tobas de igual composición, que afloran en el río Venamo (al sur de la isla de Anacoco).

Localidad tipo: Se ha designado como sección tipo el sector a lo largo del río Venamo, en el centro de un sinclinal abierto, cuyo eje tiene un rumbo este-oeste, entre un punto cuyas coordenadas son: Norte, 6° - 35' - 00", Este, 61° - 13' - 53" y otro de coordenadas: Norte, 6° - 28' - 57" y Este, 61° - 11' - 55".

Descripción litológica: Esta constituida de metalavas andesíticas y algunas tobas de igual composición, así como unos dos horizontes de brecha volcánica epiclástica, las cuales gradan lateralmente a las tobas. Las rocas de esta unidad, han sido afectadas por un metamorfismo regional de bajo grado, facies de los esquistos verdes y las lavas se presentan en flujos con espesores variables, difíciles de precisar por la cizalla que afecta esta unidad, con amígdalas rellenas con cuarzo blanco o rosado, de 0,3 a 1 cm de diámetro y hasta de 2 a 3 cms. Las mayores se presentan de forma alargadas, aparentemente paralelas a la foliación, la cual es producto del cizallamiento. Estas rocas se presentan fuertemente cizalladas e inyectadas por venas de cuarzo muy finas, paralelas a la cizalla, a veces discontinuas y con mineralización de sulfuros (pirita). Se observa también una colada de lavas con almohadillas pequeñas y de aspecto rústico, con amígdalas rellenas por cuarzo rosado. Las rocas que conforman esta unidad litológica son de granularidad variables. Por su grano van desde afaníticas a grano fino; algunas lavas muestran textura porfídica, con fenocristales de plagioclasa y/o de anfíbol. El color varía de verde claro a verde ligeramente oscuro, con tintes azulosos, en las rocas no cizalladas o muy poco cizalladas, mientras que las rocas cizalladas presentan una coloración gris oscura a negro verdoso. Estas rocas son de aspecto homogéneo y masivas.

Extensión geográfica: La unidad aflora, alcanzado su mejor desarrollo, en el río Venamo, en la sección tipo, en forma de una faja angosta limitada al oeste por una intrusión de diabasa sin metamorfismo (diabasa post - Roraima) y hacia el este, en Guyana, donde posiblemente se presenta cubierta por los sedimentos del Grupo Roraima, y luego aflora nuevamente en dicho río más al sur.

Contactos: La Formación Venamo ocupa la parte superior del Grupo Botanamo, pasando transicionalmente hacia abajo a la Formación Caballape, la cual constituye la base de este grupo; siguiendo más al sur la Formación Venamo se presenta en contacto discordante, con rocas del Grupo Carichapo.

Espesor: Su espesor se estimó en 3.000 m.

Edad: Precámbrico. Tomamos la edad establecida en la región de Guasipati (Menéndez, 1968) para la Formación Caballape.

Correlación: Esta unidad se puede considerar equivalente en tiempo a la Formación Los Caribes, pero no existe otra descripción litológica igual a ésta en el Escudo Guayanés en Venezuela.

Importancia económica: No se conoce ningún tipo de mineralización de importancia económica en esta unidad litológica. Aun cuando la presencia de la inyección de vetas de cuarzo y de sulfuros (Pirita) en la roca podrían sugerir la existencia de una posible mineralización aurífera.

© M. E. M., 26 de Noviembre de 1997

Referencias

Benaím, N., 1997. ??????????????????????

Menéndez, V. de V., A., 1968. Revisión de la estratigrafía de la Provincia de Pastora según el estudio de la región de Guasipati, Guayana venezolana. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 309-338.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)