




CRETACICO (Aptiense - Albiense)

Estado Sucre

Referencia original: E. Rod y W. Maync, 1954, p. 239.

Consideraciones históricas: Rod y Maync (1954), introdujeron en la literatura el término Formación Valle Grande, para designar a una secuencia constituida por margas, con intercalaciones de capas delgadas de calizas glauconíticas, areniscas glauconíticas verde oscuro y algunas areniscas blancas, que afloran 4 km al este de la población de Cumanacoa, estado Sucre.

Guillaume *et al.* (1972), comparan la Formación García con la Formación Valle Grande, e indican que el contacto inferior de estas unidades con la Formación Taguarumo, presenta rasgos idénticos entre sí, en cuanto a litología, contenido faunal y preservación, lo cual sugiere no sólo una equivalencia cronológica, sino también un evento geológico idéntico para ambas formaciones, es decir, la misma transgresión después del mismo diastema.

Localidad tipo: Sección expuesta a lo largo del camino desde Valle Grande hasta San Juanillo, 80 m al sureste del trapiche de Valle Grande, situado al este de la población de Aricagua (Cumanacoa), estado Sucre.

Descripción litológica: La unidad en su sección tipo está constituida predominantemente por margas de color grisáceo oscuro, que meteoriza a gris claro y crema, con delgadas intercalaciones de calizas y areniscas glauconíticas, con belemnites, de color marrón verdoso que meteorizan a marrón claro verdoso. Estas intercalaciones solo representan un pequeño porcentaje de la sucesión.

Espesor: En su localidad tipo mide de 120 a 150 m de espesor. No se conocen espesores medidos de esta unidad en otras áreas donde aflora.

Extensión geográfica: La Formación Valle Grande se encuentra desarrollada en la región de San Juanillo-Valle Grande, al este de la población de Cumanacoa y en el área de Cariaco-Catuaro, estado Sucre. Esto hace suponer que la unidad se extiende desde Cumanacoa hacia el noreste.

Expresión topográfica: La unidad se presenta formando colinas bajas, de pendiente suave, las cuales debido a su carácter predominantemente lutítico tienden a desarrollar patrones de drenaje dendrítico.

Contactos: El contacto inferior es concordante y de marcado contraste litológico con la Formación Taguarumo, y el contacto superior es discordante con la parte superior de la Formación Chimana, Maync (1956).

Fósiles: La fauna que presenta esta formación es muy variada y abundante. En los niveles basales fueron encontrados géneros de amonites como: *Aconeceras*, *Dufrenoya*, *Colombiceras*, *Megatyloceras*, *Hypaclanthoplites*, etc., los cuales son diagnósticos para el Aptiense Superior, (zona de *Chelonicerases martini*). Además, casi todos los niveles de calizas y areniscas glauconíticas contienen belemnites del género *Neohibolites*.

La microfauna es semejante a la que presenta la Formación García y se ubica en las zonas de *Biglobigerinella barri* y *Praeglobotruncana infracretacea*.

Edad: En base a su contenido faunal, especialmente de amonites, la Formación es de edad Aptiense Superior.

Correlación: La unidad se correlaciona con la Formación García del oriente de Venezuela.

© G. Hernández, 1997

Referencias

Guillaume, H. A., H. M. Bolli y J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretácico Inferior en la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp. 5(3): 1619-1655.

Rod, E. and Maync, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 38(2): 193-283.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, H. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol., Bull.*: 28(1): 1-28.

Renz, H. H., 1961-a. Correlation of geologic formations in Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 4(6): 199-203.

Renz, H. H., 1961-b. The Cretaceous-Tertiary and Oligocene-Miocene boundaries in Venezuela: a reply. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 4(8): 259-261.

Rosales, H., 1959. Discusión sobre la Formación El Cantil del noreste de Venezuela. *Bol. Geol., Caracas*, 5(10): 99-105.

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior Venezuela nororiental. *Bol. Geol., Caracas, Pub. Esp.* 2(3): 471-495.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the Stratigraphic Nomenclature in the Eastern Venezuela Basin. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol. Bol. Inf.* 7(6): 153-202.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la Industria Petrolera en Venezuela. Cong. Ven. Geol. Min. Petrol. I, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. : 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol., Bol. Inf.*, 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)