




TERCIARIO (Paleoceno - Eoceno)

Estado Cojedes

Referencia original: C. M. B. Caudri, 1948, p. 479.

Consideraciones históricas: Este nombre fue introducido casualmente por Caudri (1948), aunque la unidad fue descrita mucho más tarde por Young (1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*). Una descripción adicional e ilustrada fue publicada por Salvador (1961-b). Algunas calizas de la unidad han sido consideradas como miembros formales (La Paz, Cuicas, El Cumbe) por algunos autores. No obstante, según Salvador (1961-b), estos nombres deben tratarse como informales por el carácter lenticular y discontinuo de las calizas. Su separación se ha basado más en contenido faunal que en diferencias litológicas (Young, 1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*). La breve descripción que Sutton (1946) hace del "miembro de caliza de Cuicas de Misoa" podría tomarse como referencia a la totalidad de la Formación Valle Hondo de uso actual, pero el nombre nunca ha sido aceptado en ese sentido.

Localidad tipo: A lo largo de la Carretera Trasandina desde Casa de Zinc, en el río Carache, hasta Valle Hondo, situado 4.5 kilómetros al sureste de La Cuchilla, en Trujillo septentrional (Hoja N° 6144, escala 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: En su mayor parte, la unidad consiste de lutitas y limolitas arenosas y areniscas argiláceas irregularmente intercaladas, y es casi idéntica a la Formación Ranchería contigua. Sin embargo, difiere de ella por su contenido de capas lenticulares discontinuas de calizas arrecifales macizas, de color gris azulado, y areniscas cuarzosas muy duras. La Formación Valle Hondo se depositó en un ambiente marino somero. Presenta lutitas carbonosas con restos de plantas, lo que evidencia la proximidad de la línea de costa e importante influjo clástico del avance deltaico. Hacia la parte media de la unidad se observa intercalación de facies de llanura de manera con canales de marea.

Espesor: No se han medido secciones completas, pero el espesor se estima que aumenta hacia el norte, desde 300 metros en el límite lateral con la Formación Ranchería, hasta más de 1000 m.

Extensión geográfica: La Formación Valle Hondo se presenta en una zona restringida cerca de las cabeceras del río Carache, en Trujillo septentrional.

Contactos: La Formación Valle Hondo es concordante y generalmente transicional por encima de las lutitas de foraminíferos de la Formación Colón y por debajo de las areniscas de la Formación Misoa (denominadas a veces localmente "Formación Escuque").

Importancia económica: La Formación Valle Hondo, presenta importantes desarrollos de calizas, sobre todo el área de Cuicas, las cuales constituyen un recurso aprovechable para la fabricación de cal y cemento.

Sinonimia: "Miembro de caliza de Cuicas", en el sentido de Sutton (1946).

© **M. E. M. 3er Léxico**

Referencias

- Caudri, C. M. B., 1948. Note on the stratigraphic distribution of Lepidorbitoides, *Jour. Paleont.*, 22(4): 473-481.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. *Léxico Estratigráfico de Venezuela. Bol. Geol., Pub. Esp.*, 1, 728 p.
- Salvador, A., 1961-b. Guidebook to the geology of northeastern Trujillo. *Soc. Geol. Venez. Occid.*, Guidebook No. 3, 33 p.
- Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cizancourt, M. de and D. L. Frizzell, 1949. Ferayina in the middle Eocene of Venezuela, *Jour. Paleont.*, 23(6): 496-497.

Cizancourt, M. de, 1948. Matériaux pour la paléontologie et la stratigraphie des régions Caraïbes, *Soc. Géol. France, Bull.*, 18: 663-674.

Cizancourt, M. de, 1951. Grands Foraminifères du Paléocène, de l'Eocène inférieur et de l'Eocène moyen du Vénézuéla, *Mém. Soc. Géol. de France*, 30(1-2)(Mém. 64): 68.

González de Juana, C., 1951. Introducción al estudio de la geología de Venezuela: Las formaciones del Eoceno en los Andes venezolanos y en la subcuenca del Lago de Maracaibo, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(3): 265-287.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Forth Worth, Texas, 552 p.

Salvador, A., 1950. Stratigraphy of the Chejendé region, Venezuela, *Ph. D. Thesis, Stanford University*.

Tash, G. E., 1937. Stratigraphy and paleontology of the Mene Grande and vicinity, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 159-172. (English ed.).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)