




TERCIARIO (Mioceno Medio-Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 59-63.

Esta es una de las zonas del Grupo Agua Salada, establecidas por H. H. Renz (1948) Suprayace a la de *Globorotalia fohsi* e infrayace a la de *Marginulinopsis bassispinosus*; corresponde a parte del Miembro

Husito de la Formación Pozón. Su base se reconoce en particular por la extinción de *Globorotalia fohsi*.

Petters y Sarmiento (1956) reconocieron el equivalente de la zona en Colombia. Blow (1959) estudió los foraminíferos planctónicos del Grupo Agua Salada y estableció la equivalencia de la Zona de *V. herricki* con el intervalo de la Zona de *Globorotalia fohsi* y parte de la de *G. mayeri*. Según los criterios modernos, su edad es Mioceno Medio a Tardío. Se ha sugerido que la especie titular de la zona pertenece al género *Cibicorbis*, y no a *Valvulineria* (Loeblich y Tappan, 1964).

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Loeblich Jr., A. R. y H. Tappan, 1964 en: Moore, R. C. (ed): Treatise on invertebrate paleontology, Part C. Protista-2. Sarcodina, chiefly "Thecamoebians" and Foraminifera. *Geol. Soc. Amer. y Univ. Kansas Press*, 900 p.

Petters, V. y S. R. Sarmiento, 1956. Oligocene and Lower Miocene biostratigraphy of the El Carmen-Zambrano Area, Colombia. *Micropaleontology*, 2(1): 7-34.

Renz, H. H., 1948. Startigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Enviar Comentarios



1st Ed. English



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)