

## CRETACICO TARDIO

Estado Zulia

**Referencia original:** C. E. Key, 1960, p. 529-530.

Este término, publicado originalmente por Key (1960), ha sido utilizado informalmente durante muchos años para designar una unidad bioestratigráfica característica que se reconoce en la parte inferior de la Formación Colón en gran parte de la cuenca del lago de Maracaibo.

Según Key, las siguientes especies identifican la zona: *Bulimina petrolera*, *Clavulinoides trilatera* var. *concava*, *Dorothia* sp. cf. *D. filiformis*, *Gaudryina laevigata*, *Globotruncana arca*, *Globotruncana fornicata*, *Gyroidinoides colombianus*, *Planulina spissocostata*, *Pseudogaudryinella colombiana*, *Pseudogümbelina excolata*, *Pullenia cretacea*, *Rugoglobigerina rugosa*, *Siphogenerinoides cretaceus*.

Key señaló además que el intervalo corresponde aproximadamente a la Zona de *Pullenia cretacea*, establecida por Cushman y Hedberg (1941) en el Departamento Santander del Norte, Colombia. En su parte basal Key reconoció un conjunto faunal típico que denominó Subzona de *Bolivinoidea decoratus*.

## Referencias

Cushman, J. A. y H. D. Hedberg, 1941. New Oligocene-Miocene foraminifera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res.*, Contrib., 17-1(224): 1-27.

Key, C. E., 1960. Estratigrafía del subsuelo de Alturitas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., III: 511-545.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)