


12. Campo San Julián

El campo San Julián se encuentra al sureste de Machiques, en el Distrito Perijá.





El primer pozo, Calcaño D-1, perforado en 1930 por las empresas California Petroleum Company y Union National, atravesó las capas miocenas en el flanco este de la estructura y fue abandonado a 5778' sin encontrar indicios de hidrocarburos.

En 1981 Lagoven completó el pozo descubridor, San Julián-1, ubicado mediante levantamiento sismográfico de 1978 y 1979.

COLUMNA ESTRATIGRAFICA DEL CAMPO SAN JULIAN

TIPO	GRUPO	FORMACION	MOLOGIA	DESCRIPCION LITOLOGICA
EOCENO	GRUPO LA SIERRA	FM LOS ROQUES		Areniscas, arcillas, limolitas y conglomerados.
		FM LA SIERRA		Lutitas y areniscas. Conglomerados en la zona inferior.
		FM MIRADOR		Areniscas con lutitas. Capas de carbón en la parte basal.
PALEOCENO		FM MARCELINA		Areniscas intercaladas con lutitas. Capas de carbón cerca del top.
		FM GUASARE		Lutitas, areniscas calcáreas, limolitas. En la parte media, una capa delgada de carbón.
CRETACEO SUPERIOR	GRUPO COLON	FM MITO JUAN		Lutitas con limolitas y areniscas. Laminación de carbón y glauconitas.
		FM SOCUY		Secuencia monolítica de lutitas.
		FM MACHQUES		Calizas prísticas y glauconíticas.
		FM LA LUNA		Calizas compactas, con lútilas negras calcáreas.
CRETACEO INFERIOR	GRUPO COGOLLO	FM MARACA		Calizas con capas de conchas marinas.
		FM LISURE		Lutitas arenosas, calcáreas, compactas. Calizas en la base.
		FM PICHÉ		Calizas calcáreas, con lutitas arenosas.
		FM GUÁIMAROS		Calizas con lutitas y algunas areniscas.
		FM GUÁIMAROS		Lutitas arenosas con calizas dolomíticas.
		FM TIBÚ		Calizas y lutitas arenosas.
		FM MACHQUES		Arenas gruesas conglomeráticas.
MIOCENO		FM GARCIA		Lutitas y lutitas rojas compactas.
		FM GARCIA		Complejo arenita metamórfica.

Estratigrafía: En el Cretáceo: arenas de la Formación Río Negro y calizas y lutitas del Grupo Cogollo, formaciones Apón (Miembros Tibú, Guáimaros, Machiques, Piché) Lisure y Maraca; las calizas de La Luna; las lutitas de Colón (con la caliza Socuy y el Miembro Mito Juan). Siguen lutitas, calizas, areniscas, carbones paleocenos de Guasare y Marcelina; el Eoceno con areniscas y lutitas de la Formación Mirador y conglomerados basales, lutitas y areniscas de la Formación La Sierra.



Estructura: Dos fallas normales de rumbo NS delimitan un domo alargado de rumbo noreste-suroeste y acentuado buzamiento este. Al norte, el domo está cortado transversalmente por una falla normal de rumbo este-oeste que aísla un bloque pequeño, con la parte sur limitada por falla normal NE-SO.

En el pozo SJ-1 se encontró una sección de la Formación Maraca repetida por una falla inversa.

FORMACION O MIEMBRO	JL-1	
	TOPE	ESPESOR
Cuiba	4.400'	1.731'
Maco a	6.131'	1.182'
Peroc	7.313'	3.361'
La Sierra	10.674'	696'
Mirador	11.370'	492'
Marcelina	11.862'	706'
Guasare	12.568'	665'
Mito Juan	13.233'	567'
Colón	13.800'	2.394'
Socuy	16.194'	86'
La Luna	16.280'	430'
Maraca	16.710'	186'
Lisure	16.896'	340'
Apón	17.236'	1.226'
Río Negro	18.462'	

Producción: La Formación Maraca aporta el 93% de la producción de San Julián-1. El mecanismo de impulso es por gas en solución, y el rendimiento de 3.120 b/d (1981), 31° API, con RGP 866, 0.0 AyS, 300-400 ppm H₂S.

© [Ramón Almarza, 1998](#)