


18. Campo Boscán

El campo Boscán está situado 40 km al suroeste de la ciudad de Maracaibo. Fue descubierto por la Richmond Exploration Company en 1945, con el pozo 7-F-1 (9598', 700 B/D). Se han perforado cerca de 600 pozos que han determinado un área probada de 600 km².



Estratigrafía: Dos pozos exploratorios alcanzaron, las calizas cretácicas, y el pozo B-215-1X llegó hasta la Formación Río Negro, encontrando una secuencia normal para el área en el cretáceo y el paleoceno.



Los sedimentos más antiguos de importancia comercial del campo fueron asignados originalmente al miembro Concepción Superior (Formación Misoa, Eoceno inferior y medio) comprenden areniscas de grano fino y lutitas carbonosas interestratificadas. En la parte alta se encuentran dos zonas de areniscas depositadas en playas y barras litorales llamadas Boscán Superior e Inferior, que alcanzan sus mayores espesores al norte y centro del campo (300-1,200').

La Formación Icotea del Oligoceno yace en discordancia sobre la Formación Misoa. La parte inferior contiene arenas productoras de 15 a 25 metros de espesor, a veces interestratificadas con arcilitas arenosas. La sección media de Icotea consiste en arcilitas y contiene areniscas delgadas en la parte oriental del campo donde producen localmente. La parte superior está constituida por sedimentos continentales y por algunas arcilitas.


La Formación La Rosa es concordante sobre Icotea y contiene lutitas de aguas salobres con fósiles y algunas areniscas limolíticas; su sección más joven, Formación Lagunillas ("La Rosa Superior") consiste en arcilitas, areniscas arcillosas, limolitas, algunos lignitos. Hacia arriba, la sucesión pasa gradualmente a la Formación La Villa, la cual se compone de arenas, gravas y arcilitas.

En la estratigrafía del campo se encuentran los nombres "Arenas de Boscán", "Las Flores" o "Concepción" para una parte de la sucesión eo-oligocena. Estos nombres fueron usados ampliamente durante la perforación que delineó el campo. Desde el punto de vista geológico, es más adecuado el nombre de Formación Misoa en lugar de Las Flores, Concepción o Boscán, utilizados anteriormente.

TABLA DE CORRELACION CAMPO BOSCAN				
EDAD (10 ⁶ AÑOS)		ESTE DE ALPUZ	LA CONCEPCION	BOSCAN Y LOS CLAROS
0	CUATERNARIO	EL MILAGRO	EL MILAGRO	EL MILAGRO
	PLEISTOCENO	ORIN		
		LA VILLA		
	MIOCENO	LOS RANCHOS	LA VILLA	LA VILLA
		CUIBA		LAGUNILLAS
50	OLIGOCENO	MACOA	MACOA	LA ROSA
		LA ROSA		
	EOCENO	PEROC	PEROC	ICOTEA
		ICOTEA		
	PALEOCENO	MISOA	MISOA	MISOA
100	CRETACEO SUPERIOR	MARCELINA		
		GUASARE	GUASARE	GUASARE
		MITO JUAN		
		COLON	COLON	COLON
		SOCUY		
	CRETACEO INFERIOR	LA LUNA	LA LUNA	LA LUNA
		COGOLLO	COGOLLO	COGOLLO
		RIO NEGRO	RIO NEGRO	RIO NEGRO
150	PRE-CRETACEO	BASAMENTO	BASAMENTO	BASAMENTO


Estructura: El anticlinal de Boscán, que constituye la estructura más importante del área. Tiene un rumbo Norte-Sur, declive hacia el sur y el cierre se efectúa poco antes de llegar al campo García. Su flanco occidental constituye el homoclinal de Boscán, de rumbo noreste y extensión regional, que buza de 8 a 10 grados hacia el suroeste.

La acumulación del campo Boscán se encuentra en una trampa estructural-estratigráfica del homoclinal de Boscán.



El homoclinal está cortado al este por la falla de Boscán, que se extiende norte-sur por 40 km desde el sur del campo La Concepción hasta el campo García, y constituye un sello estructural que limita el yacimiento; es una falla normal, tiene buzamiento pronunciado hacia el este, y desplazamiento de más de 1.000' en el norte y centro del campo.

Existen fallas menores, que no constituyen barreras de acumulación.



Hacia el norte y noroeste las arenas de Misoa desaparecen por truncamiento gradual de las areniscas de Boscán superior y gradación a lutitas del miembro Boscán inferior, dando lugar a trampas estratigráficas.

Al sur y suroeste se encuentra un contacto agua-petróleo estimado en base a un acuífero determinado en el campo Los Clavos.

Producción: El crudo es pesado (9 a 12° API). Proviene principalmente de los miembros arenosos Boscán inferior y Boscán superior de la Formación Misoa y de las areniscas de la sección basal de la Formación Icotea. Contiene 5.5% de azufre, alto porcentaje de porfirina y trazas de níquel y vanadio.

El pozo B-215X, en el área centro oriental de Boscán, encontró petróleo de un yacimiento cretácico de la Formación Apón.

