

ALIMENTACIÓN SEGURA 2026

PROY-NOM-045-SSA-2026

Alimentación Segura

Normas Específicas de Manejo, Lactarios y Banco de Leche en Neonatos

Higiene de la leche humana, procesos de pasteurización, preparación de fórmulas y desinfección estricta para evitar infecciones de transmisión alimentaria.

| Infraestructura y Áreas Exclusivas



Banco de Leche (BLH)

Área exclusiva con flujo de trabajo unidireccional (zona limpia ← zona sucia), barreras físicas completas y control de presión positiva.



Lactarios Clínicos

Independientes de quirófanos, áreas de residuos o baños. Cuentan con lavabo exclusivo y red de agua potable altamente controlada.



Preparación de Fórmulas

Establecido como "Área Blanca" aislada. Queda estrictamente prohibido el tránsito de personal externo o el acceso con ropa de calle.

Banco de Leche Humana: Procesos

Recepción y Control

- **Requisitos de Donante:** Estado de salud óptimo documentado, sin fármacos contraindicados y serología completamente negativa (VIH, Hepatitis B/C, Sífilis).
- **Etiquetado Obligatorio:** Registro indeleble de fecha y hora de extracción, nombre completo de la donante, volumen total y número de lote asignado.
- **Conservación Inicial:** Almacenamiento temporal en frío (≤ 4 °C) por un periodo máximo de 24 horas previo a su procesamiento térmico.

Pasteurización Segura

- **Temperatura Estándar:** Calentamiento constante a **62.5 °C** ± 0.5 °C durante **30 minutos exactos** para eliminar patógenos vegetativos.
- **Monitoreo Continuo:** Registro térmico mediante el uso exclusivo de termómetros de precisión previamente calibrados.
- **Choque Térmico:** Enfriamiento rápido y progresivo a temperaturas inferiores a **< 10 °C** en un lapso no mayor a 30 minutos.

Conservación y Caducidad de Leche

Estado de Conservación	Temperatura de Consigna	Tiempo Límite de Uso / Caducidad	Requisito Normativo Adicional
Refrigeración en BLH	$\leq 4\text{ }^{\circ}\text{C}$	Máximo 48 horas	Aplica para lotes ya pasteurizados
Congelación Estándar	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$	Hasta 6 meses	Frascos herméticos de vidrio o plástico
Congelación Profunda	$\leq -20\text{ }^{\circ}\text{C}$	Hasta 12 meses	Sujeto a control estricto de variabilidad
Descongelación	Refrigerador / Baño maría $\leq 37\text{ }^{\circ}\text{C}$	Consumo antes de 24 horas	Prohibido re congelar

** Control microbiológico obligatorio por cada lote: Ausencia absoluta de coliformes totales y Staphylococcus aureus coagulasa-positiva.*

| Extracción en Lactarios

Técnica y Tiempos de Lactario

La correcta manipulación en lactarios evita la contaminación exógena y preserva la microbiota original que estimula la inmunidad del recién nacido.

- **Extracción Fisiológica:** Lavado quirúrgico de manos del personal y lavado del pecho de la madre únicamente con agua potable para no inactivar la microbiota protectora de la areola. No utilizar jabones fuertes

- **Conservación:** Almacenamiento en recipientes estériles de grado médico. Plazo límite de 4 h a temperatura ambiente ($<25^{\circ}\text{C}$) y hasta 24 h bajo refrigeración.



Preparación de Fórmulas Lácteas

4 h

LÍMITE A TEMPERATURA AMBIENTE
Y UN MÁXIMO DE 24 H EN REFRIGERACIÓN


Prescripción y Preparación Segura:

Las fórmulas se indicarán únicamente ante la ausencia o contraindicación médica explícita de la leche materna.

Concentración Teórica Recomendada $\text{Concentración} = \frac{\text{Gramos de Polvo (g)}}{\text{Volumen de Agua Clorada (mL)}} \times 100$


Regla de Reconstitución: Respetar de manera estricta la dosificación del fabricante. Un exceso de polvo induce deshidratación hipernatrémica en el neonato; un defecto provoca desnutrición severa. No calentar en microondas.

| Sanitización Obligatoria de Utensilios



Este proceso debe ser repetido obligatoriamente antes de cada uso de biberones, mamilas, extractores de leche y vasos graduados.

Límites de Conservación de Leche Humana



El almacenamiento a temperaturas controladas preserva las propiedades inmunológicas de la leche humana y limita drásticamente la proliferación de patógenos bacterianos oportunistas.

Reglas Clínicas de Inocuidad

⊘ Queda Prohibido

- ✗ Adicionar de forma arbitraria azúcar, miel, infusiones o medicamentos a la leche humana o fórmulas sin prescripción médica directa.
- ✗ Utilizar hornos de microondas para calentar el alimento, debido a la generación de puntos calientes y la desnaturalización de proteínas.
- ✗ Preparar fórmulas lácteas con agua de grifo directa o agua excesivamente hervida que incremente los minerales disueltos.
- ✗ Completar o rellenar el volumen de un recipiente con remanentes de extracciones o preparaciones previas.

✓ Es Obligatorio

- ✓ Exigir higiene respiratoria total al personal (cubrebocas, cofia y bata estéril) durante la preparación del alimento.
- ✓ Registrar de forma estricta fecha, hora, tipo de alimento, lote y responsable de la conservación de cada recipiente.
- ✓ Realizar inspecciones de forma mensual y muestreo microbiológico de superficies, equipos y agua en el lactario y BLH.
- ✓ Investigar inmediatamente el origen alimentario ante la mínima sospecha o brote infeccioso activo en la unidad de neonatología.

Conclusiones y Consolidación

La alimentación segura del neonato y lactante es un componente crítico en la prevención de IAAS.

INMUNONUTRICIÓN

La leche materna es el estándar de oro que protege contra la enterocolitis necrotizante e infecciones nosocomiales en prematuros.

INFRAESTRUCTURA BLH

La separación física y los flujos de trabajo estrictos garantizan un blindaje hermético contra la contaminación cruzada.

PASTEURIZACIÓN

La estandarización a 62.5 °C por 30 minutos elimina bacterias y virus patógenos sin alterar el perfil inmune de la leche.

TRAZABILIDAD COMPLETA

El registro de datos y el reporte inmediato ante fallas en la red de frío o sospechas de brotes salvan vidas en la TIN.

-
- Proyecto de Norma Oficial Mexicana **PROY-NOM-045-SSA-2026**, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud.
 - Manual de Operación para Bancos de Leche Humana en Unidades Médicas, Secretaría de Salud, México, 2026.