

23. 圖(十二)為可樂包裝上的碳足跡標籤。標籤上的數字代表此可樂(包含瓶子)從製造、運輸、使用到回收等過程中，各階段所產生的溫室氣體，經換算後相當於總共排放出 280 g 的二氧化碳。若某運動飲料的碳足跡經換算後為 8 莫耳的二氧化碳，則此運動飲料的碳足跡標示應為下列何者？(碳和氧的原子量分別為 12 與 16)



圖(十二)

- (A) (B) (C) (D)



24. 現今智慧型手機可下載許多不同的 App (應用程式)，其中一些可用來量測週遭聲波的音量，當音量愈大時，App 顯示的數值也愈大，則此數值的大小主要與

關於修正此錯誤的方式，下列何者最適當？

- (A)將實驗中的凹透鏡乙改為焦距較甲短的凸透鏡
- (B)將實驗中的凹透鏡乙改為焦距較甲長的凸透鏡
- (C)將實驗中的凹透鏡丙改為適當焦距的凸透鏡
- (D)將步驟 3 中的凹透鏡丙改放置在凹透鏡乙與屏幕之間

圖(二十四)為小萍進行溶液配製的步驟示意圖，已知步驟一的兩個燒杯內，其中一杯裝有密度為 1.8 g/cm^3 、重量百分濃度為 98% 的硫酸 100 mL，另一杯裝有蒸餾水。開始進行溶液配製前，兩杯內液體的溫度均為 25°C 。



圖(二十四)

53. 若要符合實驗安全與合理的實驗結果，步驟一手持燒杯中裝有的液體種類，以及步驟二測量到的溫度計數值，下列何者合理？

(A)為硫酸

(B)為硫酸

(C)為蒸餾水

(D)為蒸餾水



54. 若最後小萍配製出的溶液體積恰為 200 mL，則此溶液的容積(體積)莫耳濃度為下列何者？(H_2SO_4 的分子量為 98)

(A) 0.36 M

(B) 1.80 M

(C) 2.78 M

(D) 9.00 M

54. 若最後小萍配製出的溶液體積恰為 200 mL，則此溶液的容積(體積)莫耳濃度為下列何者？(H_2SO_4 的分子量為 98)
- (A) 0.36 M
(B) 1.80 M
(C) 2.78 M
(D) 9.00 M