PANDUAN LATIHAN DAN PEREGANGAN DI RUMAH

RS Medistra Horizon Medan - Unit Fisioterapi, Lt 3 Rehabilitation Center

Lembar pengingat gerakan yang diajarkan fisioterapis Anda.

1. PRINSIP AMAN SEBELUM MULAI

Lakukan pemanasan ringan 5 menit: jalan di tempat atau putar bahu pelan.
Tarik napas teratur. Jangan menahan napas saat meregang.
Peregangan boleh terasa tarikan ringan, bukan nyeri tajam. Skala nyeri maksimal 3 dari 10.
Pakai alas tidak licin dan kursi bersandaran untuk menjaga keseimbangan.
Catat setiap hari: gerakan, jumlah pengulangan, dan rasa setelahnya.

2. LEHER DAN BAHU

Dongakkan kepala ke satu sisi, tahan 20 detik, ulangi 3 kali tiap sisi.
Putar bahu ke belakang 10 kali, lalu ke depan 10 kali.
Silangkan lengan di depan dada untuk meregangkan bahu bagian belakang, tahan 20 detik.
Angkat bahu ke arah telinga lalu turunkan perlahan, 8 kali pengulangan.

3. PUNGGUNG BAWAH DAN PINGGUL

Berbaring telentang dengan lutut ditekuk, peluk satu lutut ke dada 20 detik, bergantian.
Putar pinggang ke kiri dan kanan dengan bahu tetap menempel di lantai, 10 kali tiap sisi.
Gerak punggung posisi kucing-unta: lengungkan lalu busungkan, 10 kali pelan.
Berdiri dengan tangan di pinggang, condongkan badan ke samping, tahan 15 detik tiap sisi.

4. KAKI, BETIS, DAN HAMSTRING

Dorong tumit ke lantai sambil menahan ujung kaki untuk meregangkan betis, tahan 25 detik.
Letakkan tumit di anak tangga rendah, condongkan badan ke depan, tahan 25 detik.
Duduk dengan satu kaki lurus, bungkukan badan sejauh yang nyaman, tahan 20 detik.
Naik turun kursi kokoh 10 kali untuk kekuatan paha, berpegangan bila perlu.

5. PORSI DAN FREKUENSI

Ulangi rangkaian ini 1 sampai 2 kali sehari, kecuali fisioterapis menulis lain.
Tambah durasi tahan maksimal 5 detik per minggu, bukan menambah nyeri.
Pada hari sesi klinik, hindari latihan berat tambahan.
Bawa catatan harian Anda saat evaluasi ulang tiap 4 sampai 6 sesi.

6. TANDA ANDA HARUS BERHENTI

Nyeri tajam, menusuk, atau bertambah saat gerakan berlangsung.
Kesemutan, kebas, atau kelemahan baru pada tangan atau kaki.
Pusing, sesak napas, atau dada terasa berat selama latihan.
Bengkak atau kemerahan pada sendi yang sedang diterapi.
Segera konsultasi jika nyeri lebih dari 6 dari 10, dan hentikan gerakan sampai diperiksa.

Panduan ini bersifat umum dan tidak menggantikan program tertulis dari dokter Sp.KFR dan fisioterapis Anda.