PANDUAN MANDIRI KEMOTERAPI DI RUMAH

RS Medistra Horizon Medan - Unit Onkologi, Lt 5 Oncology Day Care

Lembar pegangan pasien dan keluarga antara satu siklus dan siklus berikutnya.

1. SEBELUM HARI SIKLUS

Cek tanggal pada kartu kontrol dan datang sesuai sesi: 08.00-13.00 atau 13.00-18.00.

Bawa kartu kontrol, daftar obat jalan, dan hasil lab terakhir (darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal).

Pastikan ada pendamping yang mengantar pulang, terutama pada siklus pertama.

Makan cukup sebelum datang. Tidak perlu puasa kecuali diarahkan dokter penanggung jawab.

Istirahat cukup dan hindari aktivitas berat pada sehari sebelumnya.

2. OBAT YANG DIMINUM DI RUMAH

Minum obat sesuai jadwal tertulis. Jangan menghentikan atau menambah dosis tanpa izin dokter.

Obat anti-mual paling efektif diminum sebelum mual muncul, sesuai resep yang diserahkan.

Simpan obat di tempat sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari, terpisah dari obat keluarga lain.

Sisa obat sitostatika tidak dibuang ke sampah rumah tangga; kembalikan ke instalasi farmasi.

Bila satu dosis terlewat, jangan menggandakan dosis berikutnya. Telepon unit untuk arahan.

3. MUAL, LEMAS, DAN SARIWAN

Mual: porsi kecil tetapi sering, hindari makanan berminyak dan berbumbu tajam.

Lemas: istirahat singkat yang berulang, simpan tenaga untuk aktivitas yang paling penting.

Sariawan: kumur air hangat, pakai sikat gigi berbulu halus, dan laporkan bila sulit menelan.

Kerontokan rambut bersifat sementara; rambut umumnya tumbuh kembali setelah terapi selesai.

4. KEBERSIHAN DAN KEAMANAN 48 JAM PERTAMA

Sisa obat keluar lewat urine dan muntahan: siram toilet dua kali dan cuci tangan dengan sabun.

Jaga area port atau PICC tetap kering dan bersih; jangan mengurut atau memijat lokasi akses.

Cuci pakaian yang terkena muntahan secara terpisah dari pakaian keluarga lain.

Handuk, alat makan, dan sikat gigi dipakai pribadi dan tidak digunakan bersama penghuni rumah.

Hindari kontak dengan orang yang sedang demam atau infeksi menular; gunakan masker bila perlu.

5. TANDA BAHAYA - SEGERA HUBUNGI UNIT ATAU IGD

Demam 38 derajat atau lebih, menggigil, atau badan terasa sangat dingin.

Sesak napas, nyeri dada, atau jantung berdebar cepat.

Perdarahan yang sulit berhenti, mimisan berulang, bintik merah di kulit, atau BAB berwarna hitam.

Muntah terus-menerus sehingga cairan tidak bisa masuk.

Kemerahan, bengkak, nyeri, atau demam di sekitar lokasi port atau PICC.

Kejang, sakit kepala hebat yang muncul mendadak, atau perubahan kesadaran.

6. JADWAL DAN TINDAK LANJUT

Jangan menunda siklus tanpa konfirmasi dokter; hasil terapi bergantung pada ketepatan jarak antar siklus.

Lakukan cek lab penunjang pada tanggal yang tertulis di kartu kontrol.

Simpan nomor telepon unit pada ponsel pasien dan pendamping.

Catat harian sederhana: suhu, tingkat mual, porsi makan, dan obat yang diminum, untuk dibawa saat kontrol.

Informasi pada lembar ini bersifat umum dan tidak menggantikan instruksi dokter penanggung jawab Anda.