

Chapter 6 : Coordinate Geometry I

এই অধ্যায়ে ঢোকাক আগে অধ্যায় ৪ (ফাংশন ১) ও অধ্যায় ৫ (ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ১) শেষ ককর নাও। ৪ থেকে লাগবে function, domain, range আর সেটের ভাষা; ৫ থেকে লাগবে পিথাগোরাসের উপপাদ্য, তার বিপরীত উপপাদ্য, আর সদৃশ ত্রিভুজ। বৃত্তের অনুচ্ছেদে অধ্যায় ৩-এর বর্গ পূর্ণ করার কৌশলটিও একবার কাজে লাগবে।

অধ্যায় ৪-এ function-এর লেখচিত্র ইচ্ছে ককরই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল, কারণ যে সমতলের উপর লেখচিত্র আঁকা হয় সেটাই তখনো গড়ে তোলা হয়নি। এই অধ্যায়ে সেটাই গড়া হবে।

এই অনুচ্ছেদগুলোর আসল কথাটা একটাই: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি জ্যামিতিকে বীজগণিতে অনুবাদ ককর দেয়। “দুটি রেখা লম্ব” একটা জ্যামিতিক বাক্য, যা প্রমাণ ককরতে ছবি আঁকতে হয়; কিন্তু $m_1 m_2 = -1$ একটা বীজগণিতিক বাক্য, যা যাচাই ককরতে কেবল গুণ ককরলেই চলে। এই অনুবাদটুকুই ডেকার্তে (René Descartes) ও ফার্মা (Pierre de Fermat)-এর আবিষ্কার, আর পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি হিসাব এর উপরেই দাঁড়িয়ে।

এই অধ্যায়ে মোট ৩০ পয়েন্ট আছে।

১ কার্তেসীয় সমতল

ধারণা ১: সমতলের স্থানাঙ্ক

সমতলের উপর দুটি লম্ব সংখ্যারেখা আঁকো, যারা একে অপরকে দুজনেরই শূন্য বিন্দুতে কাটে। আনুভূমিকটিকে বলে x -অক্ষ, উল্লম্বটিকে বলে y -অক্ষ, আর ছেদবিন্দুটিকে বলে origin, লেখা হয় O ।

এখন সমতলের যেকোনো বিন্দু P নাও। P থেকে দুই অক্ষের উপর লম্ব ফেললে x -অক্ষে একটি সংখ্যা a আর y -অক্ষে একটি সংখ্যা b পাওয়া যায়। এই দুটি সংখ্যা লিখে রাখি ক্রমজোড় (a, b) হিসেবে; a -কে বলে P -এর x - (ভুজ বা abscissa) আর b -কে বলে y -coordinate (কোটি বা coordinate)।


শব্দটা “ক্রম”জোড়, আর ক্রমটা গুরুত্বপূর্ণ: $(2, 3)$ ও $(3, 2)$ সমতলের দুটি ভিন্ন বিন্দু।

অধ্যায় ৪-এর ভাষায় কথাটা আরও পরিষ্কার ককরে বলা যায়। সব ক্রমজোড়ের সেটটিকে লেখা হয়

$$\mathbb{R}^2 = \{ (a, b) : a \in \mathbb{R} \text{ এবং } b \in \mathbb{R} \},$$

আর উপরের নিয়মটি সমতলের বিন্দু থেকে $\mathbb{R}^2$ -এ একটি bijection তৈরি ককর: প্রতিটি বিন্দুর জন্য ঠিক একটি ক্রমজোড়, আর প্রতিটি ক্রমজোড়ের জন্য ঠিক একটি বিন্দু। এই bijection-টাই গোটা অনুচ্ছেদের ইঞ্জিন, কারণ এর জোরেই জ্যামিতির যেকোনো প্রশ্নকে সংখ্যার প্রশ্নে বদলে ফেলা যায়।

দুই অক্ষ মিলে সমতলটিকে চারটি অংশে ভাগ ককর, যাদের বলে quadrant, আর গোনা হয় ডান দিকের উপরেরটি থেকে শুরু ককর ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে।



ধারণা ২: বক্ররেখা মানে সমাধান সেট

x ও y নিয়ে একটি শর্ত লিখলে সেই শর্ত যেসব বিন্দু মানে, তারা মিলে সমতলের একটি অংশ তৈরি করে। এই সেটটিকেই বলে ওই শর্তের সমাধান সেট, আর সমীকরণের ক্ষেত্রে একে বলা হয় সমীকরণটির লেখচিত্র:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \text{শর্তটি সত্য}\}.$$

এই এক লাইনেই গোটা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ব্যাকরণ ধরা আছে। “সরলরেখা”, “বৃত্ত” বা “অধিবৃত্ত” কোনো আলাদা জাতের বস্তু নয়; এরা সবাই এক জিনিস, কেবল শর্তটা আলাদা।

মন্তব্য

অধ্যায় ৪-এ $f: A \rightarrow B$ function-এর লেখচিত্র সংজ্ঞায়িত করার কথা বলে রাখা হয়েছিল। এখন সেটা লিখে ফেলা যায়:

$$\{(x, f(x)) : x \in A\}.$$

এটাও একটা সমাধান সেট, শর্তটি হলো $y = f(x)$ । আর সেখানকার “দোটাচনা চলবে না” শর্তটির ছবি-রূপও এখন বলা যায়: কোনো উল্লম্ব রেখা এই সেটটিকে একবারের বেশি কাটতে পারবে না, কারণ কাটলে একই x -এর দুটি ভিন্ন মান থাকত। একেই বলে উল্লম্ব রেখা পরীক্ষা।

উদাহরণ ১

নিচের সেট দুটি সমতলের কোন অংশ, বর্ণনা করো।

(ক) $\{(x, y) : x < 0\}$

(খ) $\{(x, y) : |y| \leq 2\}$

সমাধান

(ক) শর্তটি কেবল x -এর উপর, y -এর উপর কোনো শর্ত নেই। তাই y যা খুশি হতে পারে, শুধু x -কে ঋণাত্মক হতে হবে। এটি y -অক্ষের বাঁ পাশের গোটা অঞ্চল, অক্ষটি নিজে বাদ; কারণ অক্ষের উপর $x = 0$, যা $x < 0$ মানে না।

(খ) অধ্যায় ৪ থেকে জানি $|y| \leq 2$ মানে $-2 \leq y \leq 2$ । তাই এটি $y = -2$ ও $y = 2$ আনুভূমিক রেখা দুটির

মারের ফালি, আর এবার রেখা দুটিও ভেতরে আছে, কারণ শর্তে সমান চিহ্ন আছে।

২ দূরত্ব ও মধ্যবিন্দু

ধারণা ৩: দূরত্ব

$P_1(x_1, y_1)$ ও $P_2(x_2, y_2)$ দুটি বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$


উৎপত্তি। $P_3(x_2, y_1)$ বিন্দুটি নাও: এর x -coordinate P_2 -এর মতো, আর y -coordinate P_1 -এর মতো। তাহলে P_1P_3 আনুভূমিক এবং P_2P_3 উল্লম্ব, ফলে P_3 -এ কোণটি সমকোণ।

একই আনুভূমিক রেখার উপর দুটি বিন্দুর দূরত্ব তাদের x -coordinate-এর পার্থক্যের পরম মান, তাই $|P_1P_3| = |x_2 - x_1|$ । একইভাবে $|P_2P_3| = |y_2 - y_1|$ । এবার সমকোণী ত্রিভুজ $P_1P_3P_2$ -তে পিথাগোরাস (অধ্যায় ৫) প্রয়োগ করে

$$|P_1P_2|^2 = |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2,$$

কারণ যেকোনো বাস্তব a -এর জন্য $|a|^2 = a^2$ । দূরত্ব অঋণাত্মক, তাই ধনাত্মক বর্গমূল নিয়েই কাজ শেষ।

$x_1 = x_2$ বা $y_1 = y_2$ হলে ত্রিভুজটি চ্যাপ্টা হয়ে যায়, ফলে উপরের যুক্তি আর খাটে না। তবে তখন সূত্রটি সরাসরি মিলিয়ে দেখা যায়: $x_1 = x_2$ হলে সূত্র দেয় $\sqrt{(y_2 - y_1)^2} = |y_2 - y_1|$, যা উল্লম্ব রেখার উপর দুটি বিন্দুর দূরত্ব হিসেবে ঠিকই আছে। ■



উদাহরণ ২

$(2, -1)$ ও $(7, 11)$ বিন্দু দুটির দূরত্ব বের করো।

সমাধান

$$d = \sqrt{(7 - 2)^2 + (11 - (-1))^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

বিয়োগ কোন দিক থেকে করলে তা অবাস্তব, কারণ পরে বর্গ করা হচ্ছে: $(2 - 7)^2$ আর $(7 - 2)^2$ একই।

ধারণা ৪: মধ্যবিন্দু

$P_1(x_1, y_1)$ ও $P_2(x_2, y_2)$ রেখাংশটির মধ্যবিন্দু

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

অর্থাৎ দুই প্রান্তের coordinate-গুলোর গড়।

উৎপত্তি। উপরের M ধরে দূরত্ব সূত্র দিয়ে হিসাব করি:

$$|P_1M|^2 = \left(\frac{x_1 + x_2}{2} - x_1 \right)^2 + \left(\frac{y_1 + y_2}{2} - y_1 \right)^2 = \frac{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}{4},$$

$$|MP_2|^2 = \left(x_2 - \frac{x_1 + x_2}{2} \right)^2 + \left(y_2 - \frac{y_1 + y_2}{2} \right)^2 = \frac{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}{4}.$$

দুটি সমান, এবং দুটিই $|P_1P_2|^2/4$ । বর্গমূল নিয়ে পাই

$$|P_1M| = |MP_2| = \frac{1}{2}|P_1P_2|.$$

তাই M দুই প্রান্ত থেকে সমদূরবর্তী, আর দূরত্বদুটি মিলে গোটা রেখাংশের দৈর্ঘ্য হয়। M যে সতিই রেখাংশটির উপরেই পড়ে, সেটা চাল দিয়ে দেখা যায়; ওটা সমস্যা ৩-এ তোমার জন্য রাখা হলো। ■


৩ চাল**ধারণা ৫: ঢাল**

কোনো অ-উল্লম্ব সরলরেখার উপর $P_1(x_1, y_1)$ ও $P_2(x_2, y_2)$ দুটি ভিন্ন বিন্দু হলে রেখাটির ঢাল (slope)

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

লব হলো উল্লম্ব পরিবর্তন বা rise, হর হলো আনুভূমিক পরিবর্তন বা run।

উল্লম্ব রেখার ঢাল সংজ্ঞায়িত নয়, কারণ তখন $x_1 = x_2$ হয়ে হর শূন্য হয়ে যায়। লক্ষ্য করো, এটা “ঢাল অসীম” নয়; এটা “ঢাল বলে কিছু নেই”।



ধারণা ৬: ঢাল কোন দুটি বিন্দু নিলে তার উপর নির্ভর করে না

একই রেখার উপর ভিন্ন ভিন্ন জোড়া বিন্দু নিলেও উপরের ভগ্নাংশটির মান একই থাকে। তাই “রেখাটির ঢাল” কথাটা অর্থপূর্ণ।

প্রমাণ। ধরি একই রেখার উপর দুই জোড়া বিন্দু P_1, P_2 এবং Q_1, Q_2 , কোনোটিই উল্লম্বভাবে সাজানো নয়। আগের ছবির মতো দুই জোড়ার জন্য দুটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো, যাদের একটি বাহু আনুভূমিক আর একটি উল্লম্ব।

দুই ত্রিভুজেরই এক কোণ সমকোণ। আর দুটিরই অতিভুজ একই সরলরেখার অংশ, আর একটি করে বাহু x -অক্ষের সমান্তরাল; তাই ওই রেখা ছেদক হিসেবে যে অনুরূপ কোণ তৈরি করে, সেটি দুই ত্রিভুজে সমান। দুটি কোণ সমান হলেই ত্রিভুজদুটি সদৃশ (অধ্যায় ৫)।

সদৃশ ত্রিভুজে অনুরূপ বাহুর অনুপাত সমান, তাই

$$\frac{\text{উল্লম্ব বাহু}}{\text{আনুভূমিক বাহু}}$$

দুই ত্রিভুজে সমান। চিহ্নও মেলে, কারণ একই রেখা বরাবর ডান দিকে গেলে y হয় দুবারই বাড়ে, নয়তো দুবারই কমে। সুতরাং দুই জোড়া বিন্দু একই ঢাল দেয়। ■

উদাহরণ ৩

$(-2, 5)$ ও $(4, -7)$ বিন্দু দিয়ে যাওয়া রেখার ঢাল বের করো।

সমাধান

$$m = \frac{-7 - 5}{4 - (-2)} = \frac{-12}{6} = -2.$$

ঋণাত্মক ঢাল, তাই ডান দিকে এগোলে রেখাটি নামে। মানটির মানে হলো: x এক একক বাড়লে y দুই একক কমে।

ধারণা ৭: ঢাল হলো পরিবর্তনের হার

$m = \Delta y / \Delta x$ ভগ্নাংশটিকে কেবল “খাড়াভাব” না ভেবে আরেকভাবে পড়া যায়: x এক একক বাড়লে y কত বাড়ে। অর্থাৎ ঢাল হলো x -এর সাপেক্ষে y -এর পরিবর্তনের হার (rate of change)।

সরলরেখার বেলায় এই হারটি সর্বত্র এক। বস্তুত “রেখাটি সরল” কথাটার বীজগাণিতিক মানেই তাই: হারটি বদলায় না।

মন্তব্য

এই দ্বিতীয় পাঠটাই এই গোটা সিরিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র, তাই এখানে থামা যাক।

সময়ের সাপেক্ষে অবস্থানের লেখচিত্র আঁকলে ঢাল হয় বেগ; বেগের লেখচিত্রে ঢাল হয় ত্বরণ। কিন্তু বাস্তবে গতি খুব কমই সুষম, তাই লেখচিত্রও খুব কমই সরলরেখা। বাঁকা লেখচিত্রে $\Delta y / \Delta x$ নির্ভর করে তুমি কোন দুটি বিন্দু নিচ্ছ তার উপর, ফলে “ঢাল” কথাটার আর একটিমাত্র মানে থাকে না।

সমাধানটা হলো দুটি বিন্দুকে ক্রমশ কাছাকাছি এনে ওই অনুপাতটির limit নেওয়া। সেই limit-এর নাম derivative, আর সেটা আসবে অধ্যায় ১৫-তে। আজ যা শিখছি, সেটা তার প্রথম বীজ: derivative আসলে ঢাল ছাড়া আর কিছুই নয়, কেবল একটিমাত্র বিন্দুতে মাপা।

৪ সরলরেখা

ধারণা ৮: বিন্দু-ঢাল রূপ

$P_1(x_1, y_1)$ বিন্দু দিয়ে যাওয়া, m ঢালবিশিষ্ট রেখাটির সমীকরণ

$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

উৎপত্তি। $P(x, y)$ বিন্দুটি, যেখানে $x \neq x_1$, ওই রেখার উপর থাকবে তখনই যখন P_1P রেখাংশের ঢাল m -এর সমান, অর্থাৎ

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m.$$

দুই পাশে $(x - x_1)$ দিয়ে গুণ করলে $y - y_1 = m(x - x_1)$ । গুণটি বৈধ, কারণ $x \neq x_1$ । আর $x = x_1, y = y_1$ বসালেও সমীকরণটি $0 = 0$ হয়ে সত্য থাকে, তাই P_1 নিজেও এর সমাধান সেটে আছে। সুতরাং সমাধান সেটটি ঠিক রেখাটিই। ■

ধারণা ৯: ঢাল-ছেদক রূপ ও সাধারণ রূপ

যে রেখা y -অক্ষকে $(0, b)$ বিন্দুতে কাটে এবং যার ঢাল m , তার সমীকরণ বিন্দু-ঢাল রূপে $y - b = m(x - 0)$, অর্থাৎ

$$y = mx + b.$$

এখানে b -কে বলে y -intercept। একইভাবে রেখাটি x -অক্ষকে যেখানে কাটে, সেই x -মানটিকে বলে x -intercept।

আবার যেকোনো রেখাকেই লেখা যায়

$$Ax + By + C = 0$$

আকারে, যেখানে A ও B একসঙ্গে শূন্য নয়। অ-উল্লম্ব রেখার জন্য $y = mx + b$ থেকে $-mx + y - b = 0$ নিলেই হয়; আর উল্লম্ব রেখার সমীকরণ $x = a$, অর্থাৎ $x - a = 0$ । এই তৃতীয় রূপটির সুবিধা হলো উল্লম্ব রেখাও এর মধ্যে ধরা পড়ে।

উদাহরণ ৪

$(-2, 1)$ ও $(4, -5)$ বিন্দু দিয়ে যাওয়া রেখার সমীকরণ বের করো, এবং তার দুটি intercept বের করো।

সমাধান

প্রথমে ঢাল:

$$m = \frac{-5 - 1}{4 - (-2)} = \frac{-6}{6} = -1.$$

$(-2, 1)$ বিন্দু ধরে বিন্দু-ঢাল রূপে

$$y - 1 = -1(x + 2) \implies y = -x - 1.$$

y -intercept হলো -1 । x -intercept পেতে $y = 0$ বসাই: $0 = -x - 1$, অর্থাৎ $x = -1$ ।

যাচাই করে নেওয়া ভালো: $(4, -5)$ বসালে $-4 - 1 = -5$, মিলে গেছে।

ধারণা ১০: সমান্তরালের শর্ত

দুটি ভিন্ন অ-উল্লম্ব রেখা সমান্তরাল হবে তখনই, যখন তাদের ঢাল সমান।

প্রমাণ। রেখা দুটি $y = m_1x + b_1$ ও $y = m_2x + b_2$ । “সমান্তরাল” মানে এদের কোনো সাধারণ বিন্দু নেই। সাধারণ বিন্দু থাকা মানে এমন x থাকা যার জন্য

$$m_1x + b_1 = m_2x + b_2, \quad \text{অর্থাৎ} \quad (m_1 - m_2)x = b_2 - b_1.$$

এটি অধ্যায় ২-এর চেনা সরল সমীকরণ, আর তার তিনটি সম্ভাবনা:

$m_1 \neq m_2$ হলে হর শূন্য নয়, তাই $x = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2}$ একটিমাত্র সমাধান আছে; রেখা দুটি ঠিক একবার মিলিত হয়, সমান্তরাল নয়।

$m_1 = m_2$ ও $b_1 \neq b_2$ হলে সমীকরণটি দাঁড়ায় $0 = b_2 - b_1 \neq 0$, যা কখনো সত্য নয়; কোনো সাধারণ বিন্দু নেই, তাই সমান্তরাল।

$m_1 = m_2$ ও $b_1 = b_2$ হলে সব x -ই সমাধান; রেখা দুটি আসলে একই রেখা, তাই “ভিন্ন” শর্তটি বাদ পড়ে।

সুতরাং ভিন্ন দুটি অ-উল্লম্ব রেখা সমান্তরাল হবে ঠিক তখনই যখন $m_1 = m_2$ । ■

ধারণা ১১: লম্বের শর্ত

দুটি অ-উল্লম্ব রেখা পরস্পর লম্ব হবে তখনই, যখন

$$m_1m_2 = -1, \quad \text{অর্থাৎ} \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}.$$

প্রমাণ। লম্ব হতে হলে রেখা দুটিকে মিলিত হতেই হবে; ধরি তারা P বিন্দুতে মেলে। প্রথম রেখার উপর P থেকে ডান দিকে ঠিক এক একক সরে যে বিন্দুটি পাই তাকে বলি A , আর দ্বিতীয় রেখার উপর একইভাবে পাওয়া বিন্দুটিকে বলি B । ঢালের সংজ্ঞা অনুযায়ী A হলো P থেকে ডানে ১ ও উপরে m_1 , আর B হলো P থেকে ডানে ১ ও উপরে m_2 ।

দূরত্ব সূত্র দিয়ে তিনটি দৈর্ঘ্যের বর্গ বের করি। A ও B দুজনেরই x -coordinate P -এর চেয়ে ১ বেশি, তাই তাদের মধ্যে আনুভূমিক পার্থক্য শূন্য:

$$|PA|^2 = 1 + m_1^2, \quad |PB|^2 = 1 + m_2^2, \quad |AB|^2 = (m_2 - m_1)^2.$$

অধ্যায় ৫ অনুযায়ী P -এ কোণটি সমকোণ হবে তখনই, যখন $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2$; এক দিকে পিথাগোরাস, উল্টো দিকে তার বিপরীত উপপাদ্য। শর্তটি লিখি:


$$(1 + m_1^2) + (1 + m_2^2) = m_2^2 - 2m_1m_2 + m_1^2.$$

দুই পাশ থেকে $m_1^2 + m_2^2$ কাটলে থাকে

$$2 = -2m_1m_2, \quad \text{অর্থাৎ} \quad m_1m_2 = -1.$$

প্রতিটি ধাপ উভমুখী, তাই শর্তটি ঠিক লম্ব হওয়ার সমতুল্য।

একটি রেখা উল্লম্ব হলে এই হিসাব খাটে না, কারণ তখন ঢালই নেই। সে ক্ষেত্রে অন্য রেখাটিকে আনুভূমিক হতে হবে, অর্থাৎ তার ঢাল 0; আর $m_1m_2 = -1$ শর্তটি তখন অর্থহীন। ■



ছবিতে m_2 ঋণাত্মক, তাই B নিচে নেমে গেছে; হিসাবে চিহ্নটি আপনা থেকেই ঠিক জায়গায় বসে।

উদাহরণ ৫

$(3, -1)$ বিন্দু দিয়ে যাওয়া, $2x + 5y = 7$ রেখাটির (ক) সমান্তরাল এবং (খ) লম্ব রেখার সমীকরণ বের করো।

সমাধান

দেওয়া রেখাটিকে ঢাল-ছেদক রূপে আনি:

$$5y = -2x + 7 \implies y = -\frac{2}{5}x + \frac{7}{5},$$

তাই এর ঢাল $-\frac{2}{5}$ ।

(ক) সমান্তরাল রেখার ঢালও $-\frac{2}{5}$ । বিন্দু-ঢাল রূপে

$$y + 1 = -\frac{2}{5}(x - 3) \implies 5y + 5 = -2x + 6 \implies 2x + 5y - 1 = 0.$$

(খ) লম্ব রেখার ঢাল m হলে $-\frac{2}{5} \cdot m = -1$, অর্থাৎ $m = \frac{5}{2}$ । তাই

$$y + 1 = \frac{5}{2}(x - 3) \implies 2y + 2 = 5x - 15 \implies 5x - 2y - 17 = 0.$$

দুটোতেই $(3, -1)$ বসিয়ে যাচাই করে নাও।

৫ বৃত্ত

ধারণা ১২: বৃত্তের সমীকরণ

বৃত্ত হলো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকা সব বিন্দুর সেট। বিন্দুটির নাম কেন্দ্র, দূরত্বটির নাম ব্যাসার্ধ।

কেন্দ্র (h, k) ও ব্যাসার্ধ $r > 0$ হলে বৃত্তটির সমীকরণ

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

কেন্দ্র origin হলে এটি দাঁড়ায় $x^2 + y^2 = r^2$ ।

উৎপত্তি। সংজ্ঞাটি বীজগণিতে অনুবাদ করলেই হয়ে গেল। $P(x, y)$ বৃত্তের উপর থাকবে তখনই, যখন কেন্দ্র $C(h, k)$ থেকে তার দূরত্ব ঠিক r :

$$\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r.$$

দুই পাশ অঙ্কণাত্মক, তাই বর্গ করলে সমাধান সেট বদলায় না, এবং পাই $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ । ■

মন্তব্য

লক্ষ্য করো, বৃত্ত এখানে আকাশ থেকে পড়েনি। প্রথম অনুচ্ছেদের ধারণাটি ছিল “বক্ররেখা মানে সমাধান সেট”, আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দূরত্বকে সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছিল। এই দুটো হাতে থাকলে বৃত্তের সমীকরণ আর আলাদা করে মুখস্থ করার জিনিস নয়; এটা দুই লাইনের হিসাব।

উদাহরণ ৬

কেন্দ্র $(-3, 4)$ ও ব্যাসার্ধ 5 বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ লেখো।

সমাধান

$h = -3, k = 4, r = 5$ বসিয়ে

$$(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 25.$$

লক্ষ্য করো h ঋণাত্মক বলে বন্ধনীর ভেতরে যোগ চিহ্ন এসেছে। এই জায়গাটাতেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয়।

উদাহরণ ৭

$x^2 + y^2 - 4x + 10y + 20 = 0$ সমীকরণটি একটি বৃত্ত নির্দেশ করে; তার কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ বের করো।

সমাধান

x -এর পদগুলো একসঙ্গে আর y -এর পদগুলো একসঙ্গে সাজাই, ধ্রুবকটি ডান পাশে পাঠিয়ে:

$$(x^2 - 4x) + (y^2 + 10y) = -20.$$

এবার অধ্যায় ৩-এর কৌশলে দুই বন্ধনীতেই বর্গ পূর্ণ করি, অর্থাৎ x -এর সহগের অর্ধেকের বর্গ $\left(\frac{-4}{2}\right)^2 = 4$ আর y -এর জন্য $\left(\frac{10}{2}\right)^2 = 25$ দুই পাশেই যোগ করি:

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 10y + 25) = -20 + 4 + 25,$$

$$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 9.$$

তুলনা করে পাই কেন্দ্র $(2, -5)$ এবং $r^2 = 9$, অর্থাৎ ব্যাসার্ধ 3।

মন্তব্য

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ আকারের প্রতিটি সমীকরণ কিন্তু বৃত্ত নয়। বর্গ পূর্ণ করার পর ডান পাশে যে সংখ্যাটি পড়ে, সেটিই ঠিক করে দেয় কী পাওয়া গেল:

ডান পাশ ধনাত্মক হলে সেটি একটি বৃত্ত।

ডান পাশ শূন্য হলে সমাধান সেটে কেবল কেন্দ্রটিই থাকে, কারণ দুটি বর্গের যোগফল শূন্য হয় তখনই যখন দুটিই শূন্য। একটিমাত্র বিন্দু, বৃত্ত নয়।

ডান পাশ ঋণাত্মক হলে কোনো সমাধানই নেই, কারণ বাস্তব সংখ্যার বর্গ ঋণাত্মক হয় না। সমাধান সেট ফাঁকা।

উদাহরণ: উপরের সমীকরণে 20-এর জায়গায় 30 বসালে ডান পাশ দাঁড়ায় -1 , আর সমতলে একটিও বিন্দু থাকে না।

৬ সমস্যা

[১] সমস্যা ১। নিচের বিন্দু-জোড়াগুলোর দূরত্ব বের করো।

(ক) $(2, -1)$ ও $(7, 11)$

(খ) (a, b) ও (b, a)

[১] সমস্যা ২। নিচের রেখাংশগুলোর মধ্যবিন্দু বের করো।

(ক) $(1, 3)$ ও $(7, 15)$

(খ) $(-4, 2)$ ও $(6, -8)$

[২] সমস্যা ৩। $P_1(x_1, y_1)$ ও $P_2(x_2, y_2)$ দুটি বিন্দু, যেখানে $x_1 \neq x_2$, আর M হলো তাদের মধ্যবিন্দু। ঢাল ব্যবহার করে দেখাও যে P_1 , M , P_2 একই সরলরেখার উপর আছে।

[২] সমস্যা ৪। দেখাও যে $(0, 3)$, $(-4, 0)$ ও $(4, 0)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজটি সমদ্বিবাছ।

- [২] সমস্যা ৫। $(-2, 1)$ ও $(4, -5)$ বিন্দু দিয়ে যাওয়া রেখার সমীকরণ ঢাল-ছেদক রূপে লেখো, এবং তার x -intercept ও y -intercept বের করো।
- [৩] সমস্যা ৬। $(3, -1)$ বিন্দু দিয়ে যাওয়া, $2x + 5y = 7$ রেখাটির লম্ব রেখার সমীকরণ বের করো। এরপর দুটি রেখার ছেদবিন্দু বের করো, এবং $(3, -1)$ থেকে দেওয়া রেখাটির দূরত্ব বের করো।
- [৩] সমস্যা ৭। $A(2, 1)$, $B(6, 4)$, $C(-1, 5)$ ত্রিভুজটি সমকোণী।
 (ক) পিথাগোরাসের বিপরীত উপপাদ্য ব্যবহার করে তা দেখাও।
 (খ) ঢাল ব্যবহার করে আবার তা দেখাও।
 (গ) ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের করো।
- [৩] সমস্যা ৮। নিচের প্রতিটি সমীকরণের সমাধান সেট কী, নির্ণয় করো।
 (ক) $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 20 = 0$
 (খ) $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 29 = 0$
 (গ) $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 30 = 0$
- [৩] সমস্যা ৯। y -অক্ষের উপর এমন একটি বিন্দু বের করো, যা $(5, -5)$ ও $(1, 1)$ থেকে সমদূরবর্তী।
- [৩] সমস্যা ১০। $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ বৃত্তটি নিয়ে কাজ করো।
 (ক) কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ বের করো।
 (খ) দেখাও যে এটি origin দিয়ে যায়।
 (গ) এটি x -অক্ষ ও y -অক্ষকে কোথায় কাটে?
 (ঘ) $(1, 1)$ বিন্দুটি বৃত্তের ভেতরে না বাইরে?
- [৩] সমস্যা ১১। $A(-1, 3)$ ও $B(5, -1)$ থেকে সমদূরবর্তী সব বিন্দুর সেটটির সমীকরণ বের করো, এবং দেখাও যে এটি AB রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখণ্ডক।
- [৪] সমস্যা ১২। $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ একটি ত্রিভুজের তিন শীর্ষ। ত্রিভুজের মধ্যমা হলো এক শীর্ষ থেকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু পর্যন্ত টানা রেখাংশ। প্রমাণ করো যে তিনটি মধ্যমাই

$$G = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

বিন্দুটি দিয়ে যায়। (এই G -কে বলে ত্রিভুজটির ভারকেন্দ্র।)